

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende
(progetto Check-up)



Prima generazione

per la prima generazione vengono rilevate:

- le catture settimanali e l'infestazione percentuale (nidi larvali) a fine generazione.



Primi giorni di marzo, le prime riflessioni

Si iniziano a fare le prime considerazioni sull'annata, con un'ansia fitoiatrica, da anticipo, che ci accompagna da alcuni anni.

In quel periodo si prospettava un'annata anticipata come accade già da tempo ma non così anticipata come il 2024 dove nell'azienda più precoce si catturò il 19 marzo e nemmeno come il 2023 dove nella stessa azienda si catturò il 23 marzo, anche se, in entrambe le annate, il volo più concreto si verificò ai primi di aprile. Dopodiché gli sfarfallamenti vennero rilevati, in tutte le aziende, rispettivamente il 15-17 aprile nel 2024 e l'11-12 aprile nel 2023. Insomma, ci aspettavamo una stagione con le prime catture, nelle aziende più anticipate, a fine marzo. E così è stato.

Settimana 16-19 marzo

Come nelle scorse stagioni, abbiamo provveduto all'installazione delle trappole nelle aziende dei Check-up con un certo anticipo, quindi veloci ma non di corsa.

Per l'installazione degli erogatori della confusione sessuale, riproponendo per sommi capi le tempistiche delle scorse campagne, abbiamo consigliato non oltre il 18 e il 21 marzo per essere molto prudenti e anticipare abbondantemente il volo. Per collocare le trappole abbiamo concesso qualche giorno in più dato che l'incipit degli sfarfallamenti si percepisce poi nel mese di aprile quando i voli sono generalizzati.

Input: 16/03/2026- SMS N. 4

Tigioletta: se adotti la confusione sessuale applica gli erogatori tra il 18 e il 21/3 per precedere il volo. Hai dei giorni in più se collochi solo le trappole

Settimana 23-26 marzo

Tutto tace nessuna cattura nei vigneti del Check-up controllati in questi giorni.

Settimana 30 marzo 2 aprile

Prima cattura in due vigneti Montecchio2 (30/03) e S. Martino (01/04). Nessuna cattura nei precocissimi vigneti di Castellazzo (RE), e Calvetro (RE) che di solito sono i primi a segnare l'incipit del I volo.

Settimane 6-9 aprile/13-16 aprile

In questi giorni i primi sfarfallamenti sono stati registrati in un considerevole numero di aziende.

La previsione per questi giorni

Il modello previsionale MRV indica l'inizio del volo il 7-13 aprile. Azzeccatissimo per generalità dei vigneti. Il modello segnala l'inizio del volo cogliendone l'esordio nelle casistiche più diffuse.

L'inizio della deposizione delle uova è segnalato tra il 12 e il 18 aprile.

Settimana 20-23 aprile/27-30 aprile/4-7 maggio

La prima generazione prosegue con sfarfallamenti esigui nella generalità dei casi.

La previsione per questi giorni

Il modello previsionale MRV indica il termine degli sfarfallamenti (sfarfallamento 100%, ovvero gli adulti sono nati tutti) tra il 26 aprile e il 3 maggio. L'inizio della nascita delle larve è segnalato tra il 22 e il 28 aprile.

Settimana 11-14 maggio

in molti vigneti non si cattura più o comunque le catture sono irrilevanti. In questi giorni si è verificato un vento molto forte che potrebbe aver influenzato il volo.

La previsione per questi giorni

secondo il modello, al 14 maggio dovrebbe essere ancora presente il 73-45% degli adulti, dovrebbe essere stato deposto già il 79-92% delle uova e dovrebbe essere già nato il 50-76% delle larve.

Settimana 18-21 maggio/ 25-28 maggio

Dal 18 maggio le catture si azzerano in tutte le aziende con sole due eccezioni di vigne che segnano rispettivamente tre catture l'11 e una cattura il 26 maggio. La prima generazione si esaurisce così, con poco rumore. Anche i rilievi relativi alle infestazioni larvali mostrano delle percentuali di grappoli con nidi veramente irrilevanti.

Tra il 25 e il 27 maggio abbiamo sostituito i fondi e i feromoni delle trappole per il monitoraggio del II volo, ormai imminente.

La previsione per questi giorni: secondo il modello previsionale (elaborazione del 27 maggio, previsione al 29) è nato il 94-99% delle larve e di queste è ancora presente l'89-75%. Il modello segnala anche una coda di volo pari al 19-8% di adulti ancora presenti.

Dando una scorsa più in là (fino al 4 giugno) il modello, prevede l'inizio del II volo tra il 31 maggio e il 4 giugno.

Input: SMS N. 22 del 28/05/2026

Tignoletta: la prima generazione sta terminando con attacchi per lo più esigui. Entro fine mese cambia fondi e feromoni delle trappole per monitorare il II volo

Settimana 1-4 giugno

Ai primi di giugno siamo a cavallo tra la prima e la seconda generazione. In questi giorni abbiamo terminato i controlli relativi alle infestazioni larvali di prima generazione che hanno avvalorato l'esiguità degli attacchi. Tra i campi ad oggi controllati, abbiamo intercettato le prime catture di II generazione in diverse aziende. Azzeccatissimo l'incipit del volo segnalato dal modello.

La previsione per questi giorni:

(elaborazione del 3 giugno, previsione al 5 giugno) Siamo all'inizio del secondo volo (1-10%). Sta iniziando la deposizione delle uova di seconda generazione (0-3%). È ancora presente il 68-39% di larve di prima generazione che si stanno progressivamente impupando.
