Tabella 1. Classi d'infezione rilevate per le avversità fungine e per i giallumi, nei vigneti del check-up.

Località	Grappoli colpiti % (classi d'infezione)				% Piante colpite (classi d'infezione)
	peronospora	oidio	botrite	marciume acido	giallumi
Rio Saliceto	bassa	bassa	alta	alta	bassa
Rio Saliceto	nulla	bassa	alta	alta	bassa
Rio Saliceto	nulla	bassa	alta	bassa	bassa
S. Prospero (Correggio)	media	media	alta	alta	bassa
Budrio (Correggio)	media	nulla	alta	nulla	
Fosdondo (Correggio)	media *	alta	alta	alta	bassa
Canolo (Correggio)	nulla	media	alta	bassa	
S. Martino in Rio	nulla	nulla	alta	alta	
Trignano (S. Martino in Rio)	media	bassa	alta	alta	media
S. Martino in Rio	alta	bassa	alta	alta	bassa
Bagnolo	nulla	nulla	bassa	media	media
S. Maria (Novellara)	bassa *	bassa	alta	alta	
Novellara	nulla	nulla	alta	bassa	
Fabbrico	bassa	bassa	alta	alta	media
Zurco	bassa	bassa	alta	alta	alta
Fodico (Poviglio)	nulla	nulla	bassa	nulla	
2 Castellazzo RE	nulla	nulla	alta	media	bassa
Masone- Castellazzo RE	bassa	bassa	bassa	alta	bassa
Masone RE	nulla	bassa	alta	media	bassa
Arceto (Scandiano)	nulla	bassa	media	bassa	media
Rubiera	bassa *	bassa	media	alta	alta
Borzano (Albinea)	nulla	bassa	alta	alta	
Puianello (Quattro Castella)	bassa	bassa	bassa	nulla	
Montecchio	bassa	bassa	bassa	media	media

* aziende nelle quali la peronospora è stata osservata su grappolo nella fase di fioritura.

Legenda di tabella 1

classi d'infezione	funghi: grappoli colpiti (%) giallumi: piante colpite (%)
nulla	0
bassa	0,5-5%
media	6-10%
alta	>10%