

## DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021

COLTURA: **MELONE**AVVERSITA': **Nematodi galligeni** (*Meloidogyne* spp.)

| SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI         | Numero massimo di interventi/anno per singola sostanza attiva indipendentemente dall'avversità | Numero massimo di interventi/anno per gruppo di sostanze attive indipendentemente dall'avversità | LIMITAZIONE D'USO E NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pieno campo</b>                  |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Paecilomyces lilianicus</i> (*)  |                                                                                                |                                                                                                  | (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 Kg/ha                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estratto d'aglio                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fluopyram                           | 1*                                                                                             |                                                                                                  | (*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Solo per le colture protette</b> |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abamectina                          | (*)                                                                                            |                                                                                                  | (*) Impiego con il sistema di irrigazione a goccia o in manichetta in alternativa agli altri nematocidi                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Paecilomyces lilianicus</i> (*)  |                                                                                                |                                                                                                  | (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 Kg/ha                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fluopyram                           |                                                                                                | 2*                                                                                               | (*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estratto d'aglio                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fenamifos                           | (*)                                                                                            |                                                                                                  | (*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti<br>(*) Revoca utilizzo entro 23/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oxamyl                              | (*)<br>(**)                                                                                    |                                                                                                  | (*) Ammesso solo distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 giorni di carenza. Al massimo 1 intervento/anno. In alternativa Dazomet, Metam sodio e Matam potassio<br>(**) Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la coltura in atto con formulati liquidi.<br>(**) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha |

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

INTERVENTI AGRONOMICI:

- effettuare rotazioni con specie poco sensibili;
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente;
- evitare ristagni idrici;
- utilizzo di ammendanti;
- utilizzo di pannelli di semi di brassica alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

INTERVENTI FISICI:

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di 0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni.

INTERVENTI CHIMICI:

- solo in presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni.