

Aggiornamento del 26 febbraio 2024 (BD- BDF).

Contro queste avversità non ci sono ulteriori restrizioni nelle linee guida, adottate dal Consorzio, rispetto ai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia-Romagna

<b>CICALINE (<i>Empoasca vitis</i>, <i>Zygina rhamni</i>)</b>				
<b>Massimo 1 trattamento all'anno ad eccezione dei prodotti biologici.</b>				
Si consiglia di intervenire in caso di forte infestazione (almeno 2 forme mobili per foglia).				
<i>Tipologia</i>	<i>s.a. e miscele pronte di s.a. consentite</i>	<i>N° max utilizzo e limitazioni</i>		
<b>PRODOTTI BIOLOGICI</b>	Azadiractina	-	-	-
	Sali potassici di acidi grassi	-	-	
	Olio essenziale di arancio dolce	-	-	
	Piretrine pure	-	-	
<b>PRODOTTI DI SINTESI</b>	Tau-fluvalinate	-	<b>3 I.D.A.</b>	<b>Max 1 Trattamento con prodotti di sintesi</b>
	<b>Etofenprox</b>	<b>1 I.D.A. *</b> *Tra Etofenprox, Lambdacialotrina ed Esfenvalerate, (vedi scafoideo)	Tra Etofenprox, Lambdacialotrina, Esfenvalerate, Deltametrina e Taufluvalinate (vedi scafoideo)	
	Acetamiprid *	<b>2 I.D.A.</b>	-	
	Flupyradifurone	<b>1 I.D.A.</b>	-	

Verificare la registrazione dei prodotti rispetto alla specie da trattare.

\*Acetamiprid: possiede l'indicazione di pericolo H361d (PF con concentrazione s.a. = >3%), tuttavia la s.a. con i relativi vincoli resta inclusa per la difesa dalle cocciniglie perché ritenuta strategica.

Le s.a. in **nero grassetto** sono individuate come candidate alla sostituzione.

I.D.A = Indipendentemente dall'avversità.