

GESTIONE DELLA DIFESA TERRITORIALE DELLE COCCINIGLIE FARINOSE PER TUTTI GLI SCENARI SENZA SPIROTETRAMAT

Periodo indicativo	Prodotto
metà maggio	<i>Anagyrus pseudococci (vladimiri)</i> I° lancio
pre fioritura	Pyriproxyfen*/olio minerale
primi di luglio - 2 interventi distanziati di 7 giorni	acetamiprid*/flupyradifurone*/sulfoxaflor*
metà luglio	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> - <i>Anagyrus pseudococci (vladimiri)</i> II° lancio
alla bisogna, in tempo utile tra luglio e agosto	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (se non ancora lanciato) oppure lavaggi in presenza di melata oppure nei casi peggiori (metà agosto) flupyradifurone*/sulfoxaflor*

*Massimo 1 all'anno indipendentemente dall'avversità.

NOTA

-Ad oggi, sul nostro territorio, la cocciniglia farinosa più diffusa è *Pseudococcus comstocki*, mentre *Planococcus ficus* è prevalentemente presente in infestazioni miste con la suddetta specie.

-Per l'utilizzo dei prodotti e la registrazione dei trattamenti sarà fondamentale attenersi scrupolosamente alle specie riportate nelle etichette dei vari formulati ricordando che tutti i prodotti registrati per *P. ficus* hanno efficacia collaterale anche contro *P. comstocki*.

Attenzione al numero massimo di trattamenti consentiti da disciplinare di produzione integrata (anche in relazione ad altre avversità) e da etichetta per le varie sostanze attive. Occhio alle etichette.

Sulfoxaflor: uso eccezionale, l'impiego è consentito dal 01/05/2025 al 28/08/2025.