



Aggiornamento del 26 febbraio 2024 (BD- BDF).

Contro questa avversità non ci sono ulteriori restrizioni nelle linee guida, adottate dal Consorzio, rispetto ai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia-Romagna. Tuttavia, vi sono alcune raccomandazioni relative ai due interventi obbligatori

SCAFOIDEO (<i>Scaphoideus titanus</i>)				
Nelle aree delimitate dal Servizio Fitosanitario Regionale eseguire gli interventi obbligatori previsti (ORDINANZA S.F.C. N° 4 DEL 22/06/2023 E CONSEGUENTI ATTI APPLICATIVI DEL S.F.R.)				
<i>Tipologia</i>	<i>s.a. e miscele pronte di s.a. consentite</i>	<i>N° max utilizzo</i>		
<i>PRODOTTI BIOLOGICI</i>	<i>Beauveria bassiana</i>	-	-	-
	Piretrine pure	-	-	-
	Sali potassici di acidi grassi	-	-	-
	Olio essenziale di arancio dolce	-	-	-
	Azadiractina	-	-	-
<i>PRODOTTI DI SINTESI</i>	Acetamiprid*	2 I.D.A.	-	-
	Flupyradifurone	1 I.D.A.	-	-
	Sulfoxaflor	1	-	-
	Esfenvalerate	1 I.D.A.	3 I.D.A.	-
	Lambdacialotrina			
	Etofenprox			
	Deltametrina	2		
Taufluvinate	-			

*Acetamiprid: possiede l'indicazione di pericolo H361d (PF con concentrazione s.a. = >3%), tuttavia la s.a. con i relativi vincoli resta inclusa per la difesa da Scafoideoe perché ritenuta strategica.

Per i due trattamenti obbligatori, in provincia di Reggio Emilia, raccomandiamo l'uso dei prodotti più performanti, evidenziati in giallo. In particolare:

- per il primo trattamento obbligatorio si consiglia l'utilizzo di un prodotto sistemico (tra cui Acetamiprid, Flupyradifurone o Sulfoxaflor);
- per il secondo trattamento si si consiglia l'utilizzo di un prodotto abbattente (tra cui Esfenvalerate, Lambdacialotrina, Etofenprox o Deltametrina).

Le s.a. in **nero grassetto** sono individuate come candidate alla sostituzione.

I.D.A. = Indipendentemente dall'avversità.