


---

## SITUAZIONE DI CAMPO

---

Monitoraggio in 29 aziende  
(progetto Check-up)



## Seconda generazione

Per la seconda generazione vengono rilevate:

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.



### Settimana 17-20 giugno

Si è conclusa la prima generazione e in poche aziende era già stato rilevato un inizio di II volo la scorsa settimana. In questi giorni ci aspettavamo sfarfallamenti più generalizzati ma i nostri rilievi hanno messo in evidenza assenza di volo oppure solo poche catture in alcuni campi. La seconda generazione non sembra essere ancora decollata.

Nei prossimi giorni proseguiremo i controlli alla ricerca di ovodeposizioni anche in caso di catture 0.

---

### Settimana 24-27 giugno



Seppur con valori tendenzialmente bassi, gli sfarfallamenti sono iniziati in modo generalizzato sul territorio; tuttavia, sono numerose le aziende in cui non si registrano catture, soprattutto in pedecollina. In ogni caso le catture, da alcuni anni, non sono attendibili nemmeno per descrivere il ciclo dell'insetto. A questo proposito, abbiamo iniziato i controlli dei grappoli indipendentemente dalle osservazioni delle trappole.


Nei vigneti solitamente infestati (con soglia presenza) abbiamo rilevato le prime ovideposizioni con poche uova fresche, testa nera e schiuse, anche con catture molto basse.

Nelle altre aziende la generazione è ancora ferma. In questi casi, che sono i più rappresentati, occorrerà verificare il superamento della soglia del 5% di grappoli con uova nel corso della generazione.

**Input: SMS del 26/06:** in vigne solitamente infestate viste le prime uova; con soglia presenza valuta Coragen nel weekend. Aspetta se usi altri prodotti o per soglia 5%.

---

### Settimana 1-3 luglio



Situazione stazionaria, in cui prosegue il volo con catture tendenzialmente basse o assenti, rare le eccezioni.

I controlli dei grappoli, indipendentemente dalle osservazioni delle trappole (vista la non attendibilità delle catture), hanno evidenziato la


presenza, nei vigneti solitamente infestati, di sporadiche ovideposizioni o di ancor più rare giovani larve.

In tali aziende, vista la modesta presenza dell'insetto, si consiglia di proseguire i monitoraggi e di attenderne l'evoluzione.

Nelle altre aziende i controlli non evidenziano ancora l'inizio dell'infestazione. Mantenere, anche in questi casi, monitorati i campi.

---

### Settimana 8-11 luglio



Catture sempre altalenanti e comunque tendenzialmente basse. Le farfalle in molti casi hanno dimensioni estremamente ridotte, come accade quando lo sviluppo è rapido a causa delle elevate temperature o come quando le popolazioni sono malate e poco robuste (come le vecchie popolazioni del nostro territorio).

In questi giorni, nei vigneti solitamente infestati (soglia presenza) abbiamo osservato poche uova fresche, alcune uova schiuse e soprattutto fori, anche se con valori in generale molto bassi.

In tutti gli altri vigneti del Check-up, nonostante la presenza sporadica di fori, la soglia del 5% di grappoli colpiti non è ancora stata superata. Nel corso della prossima settimana proseguiremo i controlli.

Secondo il modello previsionale dovremmo essere oltre la metà delle nascite larvali e verso la fine delle ovideposizioni.

**Input: SMS del 10/07:** ad oggi attacchi lievi. In vigne solitamente colpite controlla e valuta ovo-larv/larv. Negli altri casi stima soglia 5%, verifica anche senza volo

---