

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende
(progetto Check-up)



Seconda generazione

Per la seconda generazione vengono rilevate:

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.



Settimana 17-20 giugno

Si è conclusa la prima generazione e in poche aziende era già stato rilevato un inizio di II volo la scorsa settimana. In questi giorni ci aspettavamo sfarfallamenti più generalizzati ma i nostri rilievi hanno messo in evidenza assenza di volo oppure solo poche catture in alcuni campi. La seconda generazione non sembra essere ancora decollata.

Nei prossimi giorni proseguiremo i controlli alla ricerca di ovodeposizioni anche in caso di catture 0.

Settimana 24-27 giugno



Seppur con valori tendenzialmente bassi, gli sfarfallamenti sono iniziati in modo generalizzato sul territorio; tuttavia, sono numerose le aziende in cui non si registrano catture, soprattutto in pedecollina. In ogni caso le catture, da alcuni anni, non sono attendibili nemmeno per descrivere il ciclo dell'insetto. A questo proposito, abbiamo iniziato i controlli dei grappoli indipendentemente dalle osservazioni delle trappole.

Nei vigneti solitamente infestati (con soglia presenza) abbiamo rilevato le prime ovideposizioni con poche uova fresche, testa nera e schiuse, anche con catture molto basse.

Nelle altre aziende la generazione è ancora ferma. In questi casi, che sono i più rappresentati, occorrerà verificare il superamento della soglia del 5% di grappoli con uova nel corso della generazione.

Input: SMS del 26/06: in vigne solitamente infestate viste le prime uova; con soglia presenza valuta Coragen nel weekend. Aspetta se usi altri prodotti o per soglia 5%.

Settimana 1-3 luglio



Situazione stazionaria, in cui prosegue il volo con catture tendenzialmente basse o assenti, rare le eccezioni.

I controlli dei grappoli, indipendentemente dalle osservazioni delle trappole (vista la non attendibilità delle catture), hanno evidenziato la

presenza, nei vigneti solitamente infestati, di sporadiche ovideposizioni o di ancor più rare giovani larve.

In tali aziende, vista la modesta presenza dell'insetto, si consiglia di proseguire i monitoraggi e di attenderne l'evoluzione.

Nelle altre aziende i controlli non evidenziano ancora l'inizio dell'infestazione. Mantenere, anche in questi casi, monitorati i campi.
