


PROTOCOLLO TECNICO 2021: TIPOLOGIE DI SMS
cocciniglie farinose (GESTIONE DELLA DIFESA TERRITORIALE)

Avversità	INFORMAZIONI BIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE	INTERVENTI MECCANICI O AGRONOMICI	<p align="center">“News” TRATTAMENTI ROUTINARI</p> <p align="center"><i>Per seguire i consigli della nostra messaggistica sulle cocciniglie farinose devi individuare il tuo scenario. In che casistica ricade il tuo vigneto?</i></p>
<p>COCCINIGLIE FARINOSE</p> <p>C. farinose</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Diffusione. -Pressione delle infestazioni. -Fenofasi rilevate. -Controlli da eseguire 	<ul style="list-style-type: none"> -Aerazione della chioma. -Approccio igienico sanitario (pulizia delle attrezzature per la raccolta). -Verificare e segnare i focolai a fine stagione (per definire l'eventuale difesa nella stagione successiva). 	<p>A) Attacchi gravi già conclamati (ampia diffusione nel vigneto o in ampie parti dello stesso, + del 50% delle piante coinvolte, da inizio danni a danni seri). Se ricadi in questa casistica ti proponiamo il percorso completo. Si tratta di una linea di difesa stringente e particolarmente intensa.</p> <p>B) Presenza di focolai estesi (tanti focolai sparsi nel vigneto, coinvolte tante piante, comunque meno della metà del vigneto, danni da zero ad inizio). Se ricadi in questa casistica ti proponiamo il percorso quasi completo. Si tratta di una linea di difesa piuttosto stringente e intensa.</p> <p>C) Presenza di focolai sporadici (pochi focolai sparsi qua e là nel vigneto, di poche piante ed interessando una minoranza di piante nel vigneto, danni nulli o insignificanti). Se ricadi in questa casistica ti proponiamo un percorso che prevede alcuni interventi mirati ma non particolarmente impattanti.</p> <p>D) Focolai nuovi rilevati durante la campagna 2021 (SMS specifico inviato solo in <u>caso di numerosi rinvenimenti sul territorio</u>). (Da pochi a tanti, da poche piante a tante, da danni nulli ad iniziali, la strategia è comunque correlata al momento della scoperta della presenza). Se ricadi in questa casistica ti proponiamo un percorso in itinere finalizzato alla riduzione delle nuove infestazioni.</p>



Individua la linea di difesa che corrisponde al tuo scenario e segui i nostri sms

A) PERCORSO COMPLETO IN CASO DI: Attacchi gravi già conclamati

Periodo indicativo	Prodotto
prefioritura	piriproxifen oppure Olio estivo
post fioritura	spirotetramat
Forbice scafoideo	acetamiprid
primi di luglio	spirotetramat
metà luglio	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>
mese di luglio	Lavaggi oppure acetamiprid (nei casi peggiori)
da fine luglio ai primi di agosto	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (se non ancora lanciato) oppure Lavaggi in presenza di melata

B) PERCORSO QUASI COMPLETO IN CASO DI: Presenza di focolai estesi

Periodo indicativo	Prodotto
prefioritura	piriproxifen oppure Olio estivo
post fioritura	spirotetramat
Forbice scafoideo	acetamiprid
metà luglio	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>
mese di luglio	Lavaggi oppure acetamiprid (nei casi peggiori)
da fine luglio ai primi di agosto	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (se non ancora lanciato) oppure Lavaggi in presenza di melata

C) PERCORSO MIRATO IN CASO DI: Presenza di focolai sporadici

Periodo indicativo	Prodotto
Forbice scafoideo	acetamiprid
metà luglio	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>
mese di luglio	Lavaggi
da fine luglio ai primi di agosto	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (se non ancora lanciato) oppure Lavaggi in presenza di melata

D) Percorso in itinere

Focolai nuovi rilevati durante la campagna 2021 (SMS specifico inviato solo in caso di numerosi rinvenimenti sul territorio).

Periodo indicativo	Prodotto
Alla bisogna se si è ancora in tempo utile (giusto timing applicativo)	spirotetramat
Alla bisogna, in tempo utile tra luglio e agosto	acetamiprid
	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>
	Lavaggi

NOTA

Ad oggi, sul nostro territorio, la cocciniglia farinosa più diffusa è *Pseudococcus comstocki*, mentre *Planococcus ficus* è prevalentemente presente in infestazioni miste con la suddetta specie. Per questo motivo eventuali lanci con l'antagonista *Anagyrus* o l'applicazione della confusione sessuale (entrambi efficaci solo su *P. ficus*) non vengono contemplati nel servizio SMS, ma suggeriti nei vari bollettini che contestualizzano in modo più esaustivo gli ambiti applicativi.

Nel servizio SMS, le indicazioni di difesa sono suggerite genericamente per le cocciniglie farinose. Per l'utilizzo dei prodotti e la registrazione dei trattamenti sarà fondamentale attenersi scrupolosamente alle specie riportate nelle etichette dei vari formulati ricordando che tutti i prodotti registrati per *P. ficus* hanno efficacia collaterale anche contro *P. comstocki*.

Occhio alle etichette.