

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2026

COLTURA: **COCOMERO**

AVVERSITA': **Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae*)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	Numero massimo di interventi/anno per singola sostanza attiva, o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità	Numero massimo di interventi/anno per gruppo di sostanze attive indipendentemente dall'avversità	LIMITAZIONE D'USO E NOTE
<i>Phytoseiulus persimilis</i>			
<i>Amblyseius andersoni</i>			
Terpenoid blend QRD 460	(*)		(*) Ammesso solo in coltura protetta
<i>Beauveria bassiana</i>			
Sali potassici degli acidi grassi			
Maltodestrina			
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate			
Exitiazox		2	
Tebufenpyrad	(*)		
Abamectina	(*)		(*) Ammesso solo in coltura protetta. Al massimo 3 interventi tra Abamectina ed Emamectina
Fenazaquin	1*		(*) Ammesso solo in coltura protetta

- In coltura protetta lanci di ausiliari alla prima comparsa del fitofago. In pieno campo sono possibili lanci localizzati (su focolai isolati) con rapporto preda-predatori di 4-5:1.
- In caso di attacco generalizzato o in serra impiegare almeno 8 predatori/mq.
- Trattamenti tempestivi

INTERVENTI CHIMICI:

- in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.