

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende (progetto Check-up)



Terza generazione

Per la terza generazione vengono rilevate:

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.

Soglie per i trattamenti in terza generazione:
5% di grappoli con uova e/o fori per tutte le aziende



Foto A. Barani

Settimana 27-30 luglio

Se già dalla scorsa settimana (20-23 luglio) avevamo osservato un timido inizio di III volo, in questi giorni abbiamo rilevato un aumento delle catture, in diverse aziende, con valori modesti ma leggibili (spesso a due cifre). In svariati casi abbiamo anche intercettato le prime uova (bianche e gialle) con una frequenza e un'intensità di deposizione ancora scarse. In generale la percentuale di grappoli con uova si è attestata tra lo 0,5 e il 3%, con severità molto bassa (tendenzialmente un uovo/grappolo). Un solo caso di infestazione anomala.

Questo sembrerebbe essere il preludio della terza generazione; infatti, ad oggi le uova non si trovano con facilità, bensì si cercano.

Nel prossimo periodo sarà però di estrema importanza intensificare i controlli.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 29 luglio con previsione al 31 luglio).

Il modello previsionale segnala la prosecuzione del III volo (19-40%) e delle ovideposizioni di III generazione (7-17%). Secondo il modello la nascita delle larve di III generazione sarebbe già iniziata nelle aree più calde (0-7%) e sarebbero ancora presenti larve della generazione precedente (43-22%) che si stanno progressivamente impupando.

Il modello continua ad andare un pochetto in accelerazione

Input: 30/07/2026 – SMS N. 46

Tigioletta: esordio di III generazione. Sono in corso il III volo e la deposizione delle uova. Presto dovrai iniziare i controlli per stimare la soglia del 5%

Settimana 3-6 agosto

Nelle aziende fino ad ora controllate, il volo è insignificante e, laddove leggibile, si è assistito a un debole calo di catture. Ovideposizioni pressoché sovrapponibili a quelle della scorsa settimana, ovvero qualche uovo fresco (e in più qualche schiuso) con frequenza e severità delle infestazioni sempre modeste. Abbiamo anche intercettato alcuni “tentativi di leggero bacato” senza larva. Per il momento la situazione è in generale buona.

Tuttavia, a partire da questo periodo, occorrerà procedere con i controlli e stimare la soglia del 5% di grappoli colpiti per verificare la necessità, o meno, di ricorrere alla difesa con prodotti larvicidi. Ai primi di agosto, quest’anno, è improbabile che molte aziende abbiano già la necessità di intervenire, ma la tignoletta è estremamente difforme e necessita pertanto di verifiche e valutazioni aziendali.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 5 agosto con previsione al 7 agosto).

Il modello previsionale segnala il 69-85% di sfarfallamento. Le ovideposizioni di III generazione vanno dal 46 al 66%, la nascita larvale dal 27 al 45% ed è ancora presente l’8-0% di larve della generazione precedente.

In sostanza nelle aree più calde saremmo già oltre la metà delle ovideposizioni di III generazione e quasi a metà delle nascite larvali.

Forse il modello continua a correre un po’ oppure le popolazioni di tignoletta sono estremamente scarse?

Input: 6/08/2026 – SMS N. 49

Tignoletta: ad oggi situazione perlopiù buona. Poche uova fresche e schiuse. Da ora fino a Ferragosto stima la soglia del 5% e se la superi tratta con larvicidi

Settimana 10-12 agosto

In questi giorni, nei campi del Check-up ad oggi controllati, la situazione non sembra essere radicalmente cambiata.

Ovviamente, come già precisato, in questo periodo è fondamentale dare continuità agli specifici rilievi aziendali per verificare il superamento della soglia d'intervento del 5% ed eventualmente ricorrere a trattamenti con prodotti larvicidi.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 12 agosto con previsione al 14 agosto).

Il modello previsionale segnala l'87-96% di sfarfallamento. Le ovideposizioni di III generazione vanno dal 68 all'84% e la nascita larvale dal 52 al 71%. Nelle aree più calde è già iniziato l'impupamento (0-8%).

In sostanza, stando al modello saremmo oltre la metà della III generazione.

Le considerazioni sulla aderenza del modello alla nostra situazione territoriale sono sempre le stesse e step by step continueremo a verificare.

Input: fare riferimento all' SMS N. 49 del 6/08/2026

Settimane 17-20; 24-27 agosto

Anche in questo periodo la situazione non sembra essere radicalmente cambiata. Qualche uovo e qualche foro in più, soprattutto subito dopo Ferragosto, ma il quadro a livello territoriale sembra essere tuttora tendenzialmente buono, nella generalità dei casi, con le dovute eccezioni di infestazioni rilevanti segnalate principalmente in altri contesti.

Ovviamente, come già precisato, in questo periodo è ancora importante verificare il superamento della soglia d'intervento del 5%, sulle varietà tardive, anche se nella maggior parte dei casi la difesa dovrebbe essere già stata approntata.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 31 agosto con previsione al 1° settembre).

Il modello previsionale segnala lo svolgimento di una IV generazione che si è accavallata alla III.

Coda di III generazione: secondo il modello sarebbe ancora presente il 6-17% di adulti di III gen., lo 0-5% di uova, il 38-51% di larve e il restante 62-44% si sarebbe già impupato.

IV generazione: secondo il modello, il IV volo (con inizio il 25 agosto nelle aree più fredde e il 19 agosto in quelle più calde) si attesterebbe rispettivamente sul 14 e 26%; la deposizione delle uova (con inizio il 31 agosto nelle aree più fredde e il 25 agosto in quelle più calde) sarebbe rispettivamente del 3% e del 13%. La nascita delle larve iniziata il 30 agosto, solo nelle aree più calde, è al 4%, in queste zone, e allo 0% nelle stazioni più fredde.

Sempre qualche dubbio sulla aderenza del modello alla nostra situazione territoriale.

Input: 20/08/2026 - SMS N. 52

Tignoletta: in generale situazione buona. Lieve aumento uova schiuse e primo bacato. Stima la soglia del 5%; se superata, usa larvicidi. Attenzione alle carenze

Input: 28/08/2026 – SMS N. 55

Tignoletta: la III gen. sta terminando. In generale la difesa dove necessaria dovrebbe essere già stata effettuata. Per prudenza, ultimi controlli su cv tardive
