

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende
(progetto Check-up)



Seconda generazione

Per la seconda generazione vengono rilevate:

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.

Soglie per i trattamenti in seconda generazione:

- presenza, nelle aziende solitamente infestate
- 5% di grappoli con uova e/o fori negli altri casi



Settimana 8-11 giugno

Siamo ancora a cavallo tra la prima e la seconda generazione.

Nei controlli del 1-4 giugno avevamo intercettato le prime catture in qualche vigneto. In questi giorni abbiamo rilevato l'inizio del volo in qualche altra azienda ma in qualche caso si è verificato un piccolo stop and go.

Anche l'ovideposizione non è ancora stata osservata.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 10 giugno con previsione al 12 giugno) Il modello previsionale indica che lo sfarfallamento (il volo) ha raggiunto il 15-43%, con presenza di adulti in aumento. L'ovideposizione è iniziata in tutte le aree (4-14%) e sono in avvio le prime nascite larvali (0-4%).

Settimana 15-18 giugno

Partenza lenta per la seconda generazione.

Nelle aziende ad oggi controllate, abbiamo osservato qualche debole cattura in diversi casi anche in crescita (catture a una-due cifre). Sono ancora ben rappresentati i campi in cui non abbiamo intercettato l'inizio dello sfarfallamento.

In tutti i rilievi, fino ad ora eseguiti, l'inizio delle ovideposizioni è stato osservato in un solo campo del Check-up. Tuttavia, l'avvistamento di una discreta ovideposizione nel corso di un sopralluogo, in un vigneto molto infestato nella scorsa campagna, ci ha allertato in relazione alla situazione delle aziende sempre colpite.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 17 giugno con previsione al 19 giugno). Il modello previsionale segnala che lo sfarfallamento ha raggiunto il 45-73% e che la presenza di adulti è in aumento. L'ovideposizione va dal 18 al 40% e la nascita larvale dal 5 al 16%. È però ancora presente l'11-4% di larve di prima generazione.

Al momento il modello previsionale, sulla seconda generazione, sembra essere in anticipo rispetto alla nostra situazione di campo. Ai posteri l'ardua sentenza.

Input: 19/06/2026 – SMS N. 28

Tignoletta: prime limitate ovideposizioni in campo. Solo in vigne sempre infestate, con soglia di presenza, valuta un trattamento con ovicidi in questi giorni.

Prodotti ovicidi di riferimento da Disciplinare di Produzione Integrata:
Clorantraniliprole e Cyantraniliprole

Settimana 22-25 giugno

Per ora situazione è di scarsa presenza dell'insetto nella maggior parte dei vigneti.

Volo sempre a spot con catture tendenzialmente a una cifra. Nelle aziende, ad oggi controllate, abbiamo intercettato in rarissimi casi qualche sporadico uovo giallo, secco o schiuso, con percentuali esigue, ben lontane dal raggiungimento della soglia d'intervento.

Qualche segnalazione, derivata da osservazioni eseguite al di fuori dei Check-up, di situazioni concernenti vigne sempre infestate in cui è stato rilevato un inizio di bacato.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 24 giugno con previsione al 26 giugno). Il modello previsionale segnala il 79-92% di sfarfallamento. L'ovideposizione va dal 47 al 70% e la nascita larvale dal 23 al 47%.

Rimandiamo le considerazioni sull'affidabilità del modello, rispetto alla nostra situazione territoriale, dopo aver verificato l'evoluzione della situazione di campo nel prossimo periodo.

Tra l'altro, le elevatissime temperature di questi giorni, con massime anche di 38-39° potrebbero avere rallentato le ovideposizioni e il normale svolgimento del ciclo dell'insetto.

Input: 24/06/2026 – SMS N. 30

Tignoletta: solo nei casi critici di vigne sempre colpite, se non avevi fatto l'ovicida, verifica la presenza di fori e casomai ricorri a un larvicida specifico

Input: 25/06/2026 – SMS N. 31

Tignoletta: con attacchi moderati o medi, il secondo intervento per scafoideo, che farai prossimamente, avrà una buona azione collaterale anche su tignoletta

Settimana 29 giugno -2 luglio

Situazione pressoché sovrapponibile alla scorsa settimana con scarsa presenza dell'insetto nella maggior parte dei vigneti. Volo sempre inconsistente e a spot; qualche intercettazione in più di bacato, seppur con valori trascurabili. Nella maggior parte dei casi attendiamo di verificare l'efficacia collaterale dei trattamenti per scafoideo che verranno eseguiti nei prossimi giorni con prodotti abbattenti. Ad oggi sono poche le aziende che hanno già dovuto ricorrere a trattamenti specifici.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 26 giugno con previsione al 2 luglio). Il modello previsionale segnala che lo sfarfallamento ha raggiunto il 94-98% ed è ancora presente il 59-41% degli adulti. il volo è in calo. L'ovideposizione va dal 71 all' 87%, e la nascita larvale dal 52 al 74%. L'impupamento delle larve di II generazione, che ad oggi è va dallo 0 al 4%, è iniziato Il 28 giugno nelle aree più calde.

Settimana 6-9 luglio

Le catture sono tuttora inconsistenti, a singhiozzo, o assenti. Il quadro è sostanzialmente buono nella generalità dei casi. Tuttavia, come accade sempre in questo periodo, abbiamo rilevato un lieve aumento di bacato

in diversi vigneti, ma abbondantemente sottosoglia. È sostanzialmente una segnalazione di presenza. In ambito Check-up, nei vigneti ad oggi controllati, in un solo caso è stata superata la soglia d'intervento; a questo si aggiunge qualche altra vigna di cui non si conosce lo storico, visionata in altri ambiti, che ha evidenziato attacchi sopra soglia soprattutto verso la pede-collina nella parte ovest della provincia.

In questi giorni, sarà pertanto necessario intensificare i controlli per verificare l'efficacia collaterale dei trattamenti contro scafoideo, sulle larve di tignoletta, e stimare la soglia d'intervento. In caso di superamento sarà opportuno intervenire con larvicidi specifici.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione dell'8 luglio con previsione al 10 luglio e uno sguardo fino al 16 luglio per le fenofasi d'interesse).

È terminato lo sfarfallamento ed è ancora presente il 37-20% di adulti. Sta terminando l'ovideposizione (90-98%). La nascita larvale va dal 77 al 91% e prosegue l'impupamento (7-19%).

l'inizio del III volo nelle aree più calde è previsto in questi giorni (9-11/07) con estensione a tutte le aree entro i primi giorni della prossima settimana.

Il modello come gli altri anni segnala il III sfarfallamento più o meno in questo periodo.

Input: 9/07/2026 – SMS N. 38

Tignoletta: situazione in generale buona ma con un po' di bacato in più. Controlla e stima la soglia del 5%. Se la superi, ricorri a un larvicida specifico

Settimana 13-16 luglio

Il volo, come nelle settimane precedenti, non è disegnabile. Le catture sono sempre irrilevanti, intermittenti, o assenti. Nei campi del Check-up, abbiamo cambiato fondi e feromoni delle trappole in questi giorni.

La situazione in campo è tuttora molto buona con infestazioni sottosoglia, nella maggior parte dei vigneti. Come nella scorsa settimana abbiamo evidenziato un pochino di bacato in più, in qualche campo, quasi sempre senza larve. Si tratta di attacchi sostanzialmente irrilevanti.

Nei prossimi giorni, per chiudere il quadro della seconda generazione e liquidarla, sarà necessario proseguire i controlli per verificare l'eventuale presenza di una coda di bacato, tipica di questo periodo.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 14 luglio con previsione al 17 luglio e uno sguardo fino al 23 luglio per le fenofasi d'interesse).

Il modello previsionale segnala che in tutte le aree è iniziato il III volo (4-13%) ma è ancora presente il 17-7% di adulti di II volo. Nelle aree più calde stanno iniziando le ovideposizioni delle uova di III generazione (0-5%) ma è ancora presente un 3-2% di uova di II generazione. La nascita delle larve di II generazione ha raggiunto il 93-100% ed è ancora presente il 65-50% di larve di II generazione; a partire dal fine settimana inizierà anche la nascita delle larve di III generazione nelle aree più calde.

In sostanza si verificherebbe, già da ora, un accavallamento importante delle due generazioni.

La sensazione è che il modello vada un po' di corsa nel segnalare l'incipit della terza generazione. Ad oggi è ancora la seconda che, pur essendo striminzita, ha il ruolo di protagonista.
