

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2026

COLTURA: **MELONE**

AVVERSITA': **Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae*)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	Numero massimo di interventi/anno per singola sostanza attiva, o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità	Numero massimo di interventi/anno per gruppo di sostanze attive indipendentemente dall'avversità	LIMITAZIONE D'USO E NOTE
<i>Phytoseiulus persimilis</i>			
<i>Amblyseius andersoni</i>			
<i>Beauveria bassiana</i>			
Sali potassici degli acidi grassi			
Maltodestrina			
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate			
Terpenoid blend QRD 460	(*)		(*) Ammesso solo in coltura protetta
Abamectina	1*	2	(*) Ammesso solo in coltura protetta. Al massimo 3 interventi tra Abamectina ed Emamectina
Acequinocil	(*)		(*) Non ammesso in coltura protetta
Exitiazox			
Tebufenpyrad	(*)		(*) Ammesso in coltura protetta
Fenazaquin	1*		(*) Ammesso in coltura protetta

LANCI DI AUSILIARI:

- Alla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono possibili lanci localizzati (su focolai isolati) con un rapporto preda-predatore di 4-5:1;
- in caso di attacco generalizzato o in serra impiegare almeno 8 predatori/mq;
- trattamenti tempestivi.

INTERVENTI CHIMICI:

- in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate;
- in concomitanza o in prossimità di trattamenti aficidi.