Tabella 2. Presenza o assenza di fitofagi nel corso della stagione, nei vigneti del check-up

Località	bostrico	tripidi	cavallette *P. nana*	metcalfa	cicaline					cocciniglie			minatori fogliari		
					verde	gialla	*E. vulnerata*	*O. ishidae*	*H. hamatus*	*Planococcus spp.*	*P. corni*	*P. vitis*	*P. vitegenella*	*H. rivillei*	*A. oinophylla*
Rio Saliceto															
Rio Saliceto															
Rio Saliceto															
S. Prospero (Correggio)															NEWS
Budrio (Correggio)															
Fosdondo (Correggio)			NEWS				NEWS								NEWS
Canolo (Correggio)															
S. Martino in Rio															
Trignano (S. Martino in Rio)															
S. Martino in Rio															
Bagnolo															
S. Maria (Novellara)															
Novellara															
Fabbrico								NEWS	NEWS						
Zurco			NEWS												NEWS
Fodico (Poviglio)															
2 Castellazzo RE															
Masone- Castellazzo RE															
Masone RE															
Arceto (Scandiano)															
Rubiera															
Borzano (Albinea)															
Puianello (Quattro Castella)															
Montecchio															

Verde= assenza fitofago; Rosso= presenza fitofago