

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende (progetto Check-up)



Terza generazione

Per la terza generazione vengono rilevate:

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.

Soglie per i trattamenti in terza generazione:
5% di grappoli con uova e/o fori per tutte le aziende



Foto A. Barani

Settimana 27-30 luglio

Se già dalla scorsa settimana (20-23 luglio) avevamo osservato un timido inizio di III volo, in questi giorni abbiamo rilevato un aumento delle catture, in diverse aziende, con valori modesti ma leggibili (spesso a due cifre). In svariati casi abbiamo anche intercettato le prime uova (bianche e gialle) con una frequenza e un'intensità di deposizione ancora scarse. In generale la percentuale di grappoli con uova si è attestata tra lo 0,5 e il 3%, con severità molto bassa (tendenzialmente un uovo/grappolo). Un solo caso di infestazione anomala.

Questo sembrerebbe essere il preludio della terza generazione; infatti, ad oggi le uova non si trovano con facilità, bensì si cercano.

Nel prossimo periodo sarà però di estrema importanza intensificare i controlli.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 29 luglio con previsione al 31 luglio).

Il modello previsionale segnala la prosecuzione del III volo (19-40%) e delle ovideposizioni di III generazione (7-17%). Secondo il modello la nascita delle larve di III generazione sarebbe già iniziata nelle aree più calde (0-7%) e sarebbero ancora presenti larve della generazione precedente (43-22%) che si stanno progressivamente impupando.

Il modello continua ad andare un pochettino in accelerazione

Input: 30/07/2026 – SMS N. 46

Tigioletta: esordio di III generazione. Sono in corso il III volo e la deposizione delle uova. Presto dovrai iniziare i controlli per stimare la soglia del 5%

Settimana 3-6 agosto

Nelle aziende fino ad ora controllate, il volo è insignificante e, laddove leggibile, si è assistito a un debole calo di catture. Ovideposizioni pressoché sovrapponibili a quelle della scorsa settimana, ovvero qualche uovo fresco (e in più qualche schiuso) con frequenza e severità delle infestazioni sempre modeste. Abbiamo anche intercettato alcuni “tentativi di leggero bacato” senza larva. Per il momento la situazione è in generale buona.

Tuttavia, a partire da questo periodo, occorrerà procedere con i controlli e stimare la soglia del 5% di grappoli colpiti per verificare la necessità, o meno, di ricorrere alla difesa con prodotti larvicidi. Ai primi di agosto, quest’anno, è improbabile che molte aziende abbiano già la necessità di intervenire, ma la tignoletta è estremamente difforme e necessita pertanto di verifiche e valutazioni aziendali.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 5 agosto con previsione al 7 agosto).

Il modello previsionale segnala il 69-85% di sfarfallamento. Le ovideposizioni di III generazione vanno dal 46 al 66%, la nascita larvale dal 27 al 45% ed è ancora presente l’8-0% di larve della generazione precedente.

In sostanza nelle aree più calde saremmo già oltre la metà delle ovideposizioni di III generazione e quasi a metà delle nascite larvali.

Forse il modello continua a correre un po’ oppure le popolazioni di tignoletta sono estremamente scarse?

Input: 6/08/2026 – SMS N. 49

Tignoletta: ad oggi situazione perlopiù buona. Poche uova fresche e schiuse. Da ora fino a Ferragosto stima la soglia del 5% e se la superi tratta con larvicidi

Settimana 10-12 agosto

In questi giorni, nei campi del Check-up ad oggi controllati, la situazione non sembra essere radicalmente cambiata.

Ovviamente, come già precisato, in questo periodo è fondamentale dare continuità agli specifici rilievi aziendali per verificare il superamento della soglia d'intervento del 5% ed eventualmente ricorrere a trattamenti con prodotti larvicidi.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 12 agosto con previsione al 14 agosto).

Il modello previsionale segnala l'87-96% di sfarfallamento. Le ovideposizioni di III generazione vanno dal 68 all'84% e la nascita larvale dal 52 al 71%. Nelle aree più calde è già iniziato l'impupamento (0-8%).

In sostanza, stando al modello saremmo oltre la metà della III generazione.

Le considerazioni sulla aderenza del modello alla nostra situazione territoriale sono sempre le stesse e step by step continueremo a verificare.

Input: fare riferimento all' SMS N. 49 del 6/08/2026

Settimane 17-20; 24-27 agosto

Anche in questo periodo la situazione non sembra essere radicalmente cambiata. Qualche uovo e qualche foro in più, soprattutto subito dopo Ferragosto, ma il quadro a livello territoriale sembra essere tuttora tendenzialmente buono, nella generalità dei casi, con le dovute eccezioni di infestazioni rilevanti segnalate principalmente in altri contesti.

Ovviamente, come già precisato, in questo periodo è ancora importante verificare il superamento della soglia d'intervento del 5%, sulle varietà tardive, anche se nella maggior parte dei casi la difesa dovrebbe essere già stata approntata.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 31 agosto con previsione al 1° settembre).

Il modello previsionale segnala lo svolgimento di una IV generazione che si è accavallata alla III.

Coda di III generazione: secondo il modello sarebbe ancora presente il 6-17% di adulti di III gen., lo 0-5% di uova, il 38-51% di larve e il restante 62-44% si sarebbe già impupato.

IV generazione: secondo il modello, il IV volo (con inizio il 25 agosto nelle aree più fredde e il 19 agosto in quelle più calde) si attesterebbe rispettivamente sul 14 e 26%; la deposizione delle uova (con inizio il 31 agosto nelle aree più fredde e il 25 agosto in quelle più calde) sarebbe rispettivamente del 3% e del 13%. La nascita delle larve iniziata il 30 agosto, solo nelle aree più calde, è al 4%, in queste zone, e allo 0% nelle stazioni più fredde.

Sempre qualche dubbio sulla aderenza del modello alla nostra situazione territoriale.

Input: 20/08/2026 - SMS N. 52

Tignoletta: in generale situazione buona. Lieve aumento uova schiuse e primo bacato. Stima la soglia del 5%; se superata, usa larvicidi. Attenzione alle carenze

Input: 28/08/2026 – SMS N. 55

Tignoletta: la III gen. sta terminando. In generale la difesa dove necessaria dovrebbe essere già stata effettuata. Per prudenza, ultimi controlli su cv tardive

Settimana 31 agosto – 3 settembre

Poche novità sul versante infestazioni in campo. Sostanzialmente la partita tignoletta si sta concludendo in modo indolore, nella maggior parte dei casi, come sempre con qualche eccezione. Per prudenza,

aziendalmente si presta ancora attenzione al superamento della soglia d'intervento sulle varietà tardive.

La previsione per questi giorni

(Elaborazione del 2 settembre con previsione al 4 settembre).

Il modello previsionale segnala il proseguimento di una IV generazione accavallata alla III.

Coda di III generazione: secondo il modello sarebbe ancora presente l'1-11% di adulti di III generazione, lo 0% di uova, il 27-46 % di larve e il restante 73-54% si sarebbe già impupato.

IV generazione: secondo il modello, il IV volo va dal 23 al 38%, la deposizione delle uova dal 9 al 19% e la nascita delle larve (iniziata solo nelle aree più calde) dallo 0 al 10%.

Continuano i dubbi sulla aderenza del modello alla nostra situazione territoriale.

Input: fare riferimento all' SMS N. 55 del 28/08/2026
