



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE  
EMILIA-ROMAGNA** 2023-27

## DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

A cura di:

Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni; Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo

Cons. Fit. Provinciale di Reggio Emilia

Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni;

### **BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA**



**REGGIO EMILIA N° 23 DEL 16 LUGLIO 2026**

### **SOMMARIO**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA .....                | 2  |
| Informazioni generali e news normative .....            | 2  |
| Informazioni Meteo .....                                | 5  |
| Tecniche Agronomiche .....                              | 5  |
| Fertilizzazione .....                                   | 5  |
| Gestione del suolo .....                                | 7  |
| Avvicendamento colturale .....                          | 8  |
| Irrigazione .....                                       | 9  |
| Difesa e controllo delle infestanti .....               | 11 |
| Informazioni Generali .....                             | 11 |
| Parte Specifica .....                                   | 16 |
| Colture Arboree .....                                   | 18 |
| Colture Erbacee .....                                   | 28 |
| Colture Orticole .....                                  | 30 |
| BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA .....                | 34 |
| Informazioni generali e normative .....                 | 34 |
| Informazioni Meteo .....                                | 36 |
| Tecniche agronomiche .....                              | 37 |
| Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa ..... | 37 |
| Rotazioni .....                                         | 38 |
| Fertilizzazione .....                                   | 39 |
| Irrigazione .....                                       | 42 |
| Difesa e controllo delle infestanti .....               | 43 |
| Informazioni Generali .....                             | 43 |
| Parte Specifica .....                                   | 46 |
| Colture Arboree .....                                   | 47 |
| Colture Erbacee .....                                   | 55 |



## BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA

### INFORMAZIONI GENERALI E NEWS NORMATIVE

Le modifiche rispetto al bollettino precedente sono evidenziate in giallo (parti eliminate) e in verde (parti aggiunte/news)

#### AMBITO APPLICATIVO

Le indicazioni di seguito riportate **sono vincolanti** per la Difesa Integrata Volontaria e per le aziende inserite nei programmi relativi a:

- Marchio Sistema Qualità Nazionale Produzione integrata e certificazione ACA (Dm 4890/2014)
- Marchio regionale "Qualità Controllata" (LR 28/99)
- DM n.4969 del 29/8/2017 "Produzione Integrata in Disciplina ambientale" in applicazione del Regolamento Unione europea: 2021/2115, e tipi di spesa previsti dal Reg UE 2021/2115 obiettivi e) e f) (programmi operativi settore ortofrutta e patata).

Questo bollettino dà indicazioni coerenti con la attuale versione del Piano Strategico della PAC relativo alla programmazione 2023-2027 ai sensi del Reg. EU n. 2115/2021 e con [Disciplinari di produzione integrata](#) in vigore.

#### INDICAZIONI LEGISLATIVE

##### **SCADENZA DOMANDA UNICA**

La data per la protocollazione delle domande di pagamento è scaduta lo scorso 30 giugno 2026. Alle domande di pagamento a saldo presentate entro i 25 giorni successivi a tale data, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo al 30 giugno. Le domande di pagamento, presentate oltre il 25 luglio dalla scadenza del termine previsto, non potranno essere accolte e saranno rigettate.

##### **INTERVENTI A FAVORE DELL'USO DI TUBERI SEME CERTIFICATI**

Per sostenere la coltivazione della patata sul territorio regionale ed in particolare le imprese agricole che utilizzano tubero seme certificato, la Giunta regionale con Delibera n. 1082 del 29/06/2026, ha previsto lo stanziamento di un aiuto di 700.000 euro per l'annualità 2026 (vedi link [Sostegno ai pataticoltori, aperte le domande per accedere alle risorse del bando da 700mila euro - Agricoltura, caccia e pesca](#)). Tale adempimento è già previsto come obbligo nei Disciplinari di produzione integrata regionali

Le domande potranno essere presentate dal **06 luglio 2026 e fino alle ore 13,00 del 10 settembre 2026**

**Bando:** [Concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a patate - Agricoltura, caccia e pesca](#)

**NEWS DISCIPLINARI 2026**

Con DGR 3130 del 16/02/2026 è stato approvato l'aggiornamento dei "Disciplinari di produzione integrata 2026". Tutta la documentazione sarà resa disponibile nel sito della Regione entro la settimana [Disciplinari di Produzione Integrata regionali](#).

Ai fini della redazione del Piano di Fertilizzazione, **è disponibile la versione FertDPI 2026**, che contiene l'inserimento della coltura Luppolo, introdotta con i nuovi DPI 2026. Per quest'anno, rimane tuttavia valido l'utilizzo della versione FertDPI 2025, già disponibile nel sito: [Norme generali - 2026 -](#)

Sono state aggiornate e pubblicate le tabelle delle precipitazioni cumulate a livello comunale per il periodo autunno-invernale (1/10/2025-28/2/2026) utili per la definizione di eventuali incrementi delle dosi standard consentite. Vedi il sito [Norme generali - 2026 -](#)

**INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA DI DIFESA INTEGRATA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI 2026**

In data 8 aprile 2026 è stata approvata l'integrazione alle norme tecniche di coltura di difesa integrata e controllo delle infestanti 2026. [Norme tecniche di coltura 2026 - Agricoltura, caccia e pesca](#)

**ADESIONE SQNPI**

È disponibile nell'ambito del portale SIAN il servizio per la presentazione della domanda di adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata SQNPI per l'anno 2026.

Le disposizioni in merito all'adesione al SQNPI e alla procedura di adesione applicabili anche al 2026 sono presenti sul sito della Rete Rurale Nazionale (vedi [link](#)).

Si ricorda che per mantenere attiva l'adesione al Sistema è necessario per ciascun operatore presentare ogni anno la domanda di adesione/ aggiornamento sul portale ministeriale.

I termini per la presentazione della domanda di adesione sono stabiliti come segue:

**1) produttori (aziende agricole) - 15 maggio \***

- adesione al SQNPI con finalità certificazione uso logo SQNPI: entro il **15 maggio\***;
- adesione al SQNPI con finalità conformità ACA e per interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM): entro il **15 maggio\***;
- adesione al SQNPI con finalità certificazione uso logo SQNPI e conformità ACA: entro il **15 maggio**.

**2) condizionatori, trasformatori e distributori - in qualunque periodo dell'anno:**

- in qualunque periodo dell'anno e, comunque, **prima dell'inizio delle attività di gestione dei prodotti in regime SQNPI**. La domanda può essere effettuata esclusivamente per l'ottenimento del marchio.

**\*In data 14 maggio 2026 l'OTS ha approvato la revisione 15.1 della norma "SQNPI di Adesione, Gestione e Controllo del 2026" che proroga il termine ultimo per la presentazione delle domande al 25 luglio 2026.**

Tutte le richieste di assistenza relative a problemi tecnici che ostacolano l'adesione al SQNPI o la gestione delle procedure devono essere comunicate all'indirizzo [rrn.produzione\\_integrata@l3-sian.it](mailto:rrn.produzione_integrata@l3-sian.it). Si invita ad inoltrare le comunicazioni utilizzando una e-mail ordinaria e non una PEC al fine di velocizzare l'istruttoria della richiesta.

**QUADERNO DI CAMPAGNA INFORMATIZZATO**

La Commissione Europea con Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2203 del 31 ottobre 2025 ha posticipato al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dell'obbligo per gli utilizzatori professionali di adottare il Quaderno di Campagna dell'Agricoltore (QDCA) informatizzato; anche per il 2026 è prevista l'adesione volontaria.

## **NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE - ABBRUCIAMENTO di residui vegetali**

In base a quanto stabilito dal PAIR 2030 e al DM 69/2023 e s.m.i. in merito alle prescrizioni legate al superamento dei limiti di PM10 dell'anno scorso, nei comuni della **Pianura Ovest** **vige il divieto di abbruciamento per i mesi di luglio e agosto.**

Dal 22 giugno al 14 settembre, l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile rende attiva, su tutto il territorio regionale, la **fase di attenzione per gli incendi boschivi nella stagione estiva.**

Al momento è stato emesso un bollettino di **rischio medio (codice giallo)**, valido fino al **19 luglio** su tutto il territorio regionale, con esclusione delle zone montane: si raccomanda alla cittadinanza di gestire con la **massima cautela gli abbruciamenti di residui vegetali** dei lavori agricoli e forestali, che potranno essere effettuati solo in assenza di vento e unicamente in mattinata. **I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11 del mattino.**

La quantità giornaliera ammessa all'abbruciamento dovrà comunque non essere superiore a tre metri steri per ettaro.

Tra le principali novità introdotte dal recente aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi c'è la nuova suddivisione per **aree omogenee di rischio**, che supera la tradizionale ripartizione per province, con l'obiettivo di fornire degli avvisi più puntuali e consentire una gestione più efficace degli interventi e delle emergenze. Le nuove zone sono consultabili al seguente link: [Bollettini incendi boschivi - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.](#)

**Per consultare i bollettini visita la [pagina dedicata](#).**

Per verificare le modalità di abbruciamenti fare riferimento alla [DGR n.1142/2024](#). Per la comunicazione di un abbruciamento controllato destinata ai Vigili del Fuoco, al Comune, ai Carabinieri Forestali viene messa a disposizione una **WebApp di semplice attivazione**: [WebApp di attivazione](#).

**È possibile effettuare, in deroga, abbruciamenti di residui vegetali infetti da *Erwinia amylovora*.**

Con determinazione dirigenziale n° 2575 del 15/02/2021 il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" e in particolare:

1. raccomanda l'asportazione delle parti vegetali colpite da *Erwinia amylovora* dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;
2. dispone **l'obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli**;
3. raccomanda che tali abbruciamenti
  - avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
  - siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
  - verificare la presenza di eventuali divieti imposti a livello regionale per il rischio di incendi.

Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti **previa trasmissione di una comunicazione**, debitamente compilata e firmata, all'indirizzo mail del Servizio Fitosanitario ([omp1@regione.emilia-romagna.it](mailto:omp1@regione.emilia-romagna.it)).

Tutte le informazioni relative alle norme in materia di abbruciamenti e qualità dell'aria sono disponibili alla pagina web dedicata ([Abbruciamenti di residui vegetali - Aria - Ambiente](#))

## INFORMAZIONI METEO

Ai seguenti link sono disponibili informazioni riguardo le previsioni meteorologiche ed i dati rilevati oltre che i bollettini agrometeorologici e agrofenologici:

- [Previsioni Arpae Meteo Emilia-Romagna](#)
- [Dati in tempo reale \(da sito ARPAE\)](#)
- [Mappe agrometeo \(da sito ARPAE\)](#)
- [Bollettini agrometeo \(da sito ARPAE\)](#)
- [Bollettino agrofenologico \(da sito DISTAL - UNIBO\)](#)
- [Allerta Meteo Emilia Romagna](#)

NOTA: si segnala il seguente link per il monitoraggio degli eventi calamitosi avversi, anche di carattere temporalesco o grandinigeno: [Link Allerta Meteo Emilia Romagna](#).

## TECNICHE AGRONOMICHE

### FERTILIZZAZIONE

#### PIANI DI FERTILIZZAZIONE

**Il piano di fertilizzazione è necessario per una buona programmazione e ottimizzazione degli input in agricoltura e deve essere redatto per ogni coltura che insiste su un'area omogenea.**

**I piani di fertilizzazione (schede a dose standard o bilancio) per ciascuna coltura devono essere redatti, conservati e consultabili:**

- **entro il 28 febbraio per le colture erbacee e foraggere;**
- **entro il 15 aprile per le colture orticole, arboree e sementiere.**

Per la redazione del piano è possibile avvalersi del **Foglio di Calcolo – piano di fertilizzazione** scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna, che riporta entrambi i metodi di calcolo (metodo del bilancio o metodo delle schede standard). [Norme generali - 2026 -](#)

Durante la coltivazione è possibile aggiornare tali piani, ma la versione definitiva deve essere redatta entro:

- **il 15 settembre per le colture arboree;**
- **45 giorni prima della data presunta di raccolta per le colture erbacee di pieno campo;**
- **15 giorni prima della data presunta di raccolta per le colture orticole.**

La stesura dei piani di fertilizzazione deve basarsi su **analisi in corso di validità** (5 anni), effettuate in conformità con quanto previsto all' Allegato n. 4 – norme generali 2026); in alternativa all'analisi, può essere consultato il [Catalogo dei suoli](#), che è stato aggiornato a gennaio 2025.

Nelle aree omogenee che differiscono solo per la tipologia colturale (seminativo, orticole ed arboree) e che hanno superficie inferiori a:

- 1.000 m<sup>2</sup> per le colture orticole;
- 5.000 m<sup>2</sup> per le colture arboree;
- 10.000 m<sup>2</sup> per le colture erbacee;

le analisi del suolo non sono obbligatorie. Per queste superfici di estensione ridotta nella predisposizione del piano di fertilizzazione si assumono come riferimento i livelli di dotazione in macroelementi elevati.

### **NOTE SUGLI IMPIEGHI DI FERTILIZZANTI**

Tutti gli **impieghi dei fertilizzanti** contenenti almeno uno dei macroelementi (N, P e K) devono essere registrati nelle apposite schede entro 7 giorni dall'utilizzo, indicando anche le modalità di distribuzione. Entro i 7 giorni si deve obbligatoriamente aggiornare il registro di magazzino (carico-scarico).

La quantità di fertilizzante apportato alla coltura deve essere coerente con quanto ammesso dal Piano di Fertilizzazione (metodo del bilancio o metodo delle schede standard).

### **CONCIMAZIONE AZOTATA**

**Il frazionamento delle dosi di azoto** apportato con i concimi di sintesi è obbligatorio quando il quantitativo da distribuire per singolo intervento supera i 100 Kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 Kg/ha per le colture arboree. L'intervallo minimo tra due interventi di fertilizzazione deve essere di almeno 7 giorni.

Questo vincolo non si applica ai **concimi a lenta cessione**

Le concimazioni azotate con **prodotti di sintesi, per le colture a ciclo annuale** sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della semina (pre-semina/pre-trapianto) in quantità contenute variabili a seconda della coltura. In particolare, sono ammissibili:

- nelle colture a ciclo primaverile estivo, in prossimità della semina;

Le concimazioni azotate con **prodotti di sintesi, per le colture a ciclo pluriennale**:

- in pre-impianto non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall'impiego di ammendanti;
- nella fase di allevamento (1° e 2° anno) delle colture arboree sono ammessi solo apporti localizzati di fertilizzanti. Le quantità di azoto distribuita deve essere ridotta rispetto alla dose massima prevista nella fase di produzione; i limiti non superabili sono riportati nelle schede a dose standard. Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno;
- in piena produzione valgono le indicazioni riportate nelle norme tecniche di coltura

**Per l'utilizzo di ammendanti organici** (letame e compost), non vengono fissati vincoli specifici relativi all'epoca della loro distribuzione e al frazionamento. Occorre tuttavia rispettare i quantitativi massimi apportabili in base alla dotazione di sostanza organica del terreno (Tab 2 Cap 11 delle Norme Generali), le norme igienico sanitarie e quelle di settore (Direttiva 91/676/CEE cd. Direttiva Nitrati e Reg. Regionale 2/2024). Si ricorda che per gli ammendanti si considera un'efficienza dell'Azoto pari al 40%.

**Per gli effluenti zootecnici non palabili e palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio** si deve considerare la minore efficienza rispetto a quella dei concimi di sintesi.

Per determinare la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, è necessario prendere in considerazione il coefficiente di efficienza che varia in relazione all'epoca/modalità di distribuzione, alla coltura, al tipo di effluente, alla tessitura del terreno nonché alla quantità di azoto distribuita nella singola distribuzione (vedi Allegato II delle Norme Generali, Tab da 7 a 8c).

### **CONCIMAZIONE FOSFATICA E POTASSICA**

Nelle colture erbacee a ciclo annuale non sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni durante la lavorazione del terreno.



Per il fosforo la distribuzione può essere posticipata fino alla semina se localizzata o alla fase di pre-emergenza se in forma liquida.

Qualora si applichi la fertirrigazione non valgono le limitazioni relative all'epoca di distribuzione. Qualora si pratichi la semina su sodo i concimi fosfatici e potassici non devono essere necessariamente interrati.

Nelle colture orticole, in relazione sia alla brevità del loro ciclo vegetativo è consentita la distribuzione in copertura.

Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate in detrazione agli apporti che si effettueranno in copertura.

Negli anni successivi a quelli in cui sono stati effettuati gli interventi di arricchimento o le anticipazioni, bisognerà tener conto delle variazioni che tali apporti inducono nel terreno e adeguare opportunamente il dato di dotazione da prendere a riferimento nella stesura del piano di fertilizzazione.

In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è consentito effettuare apporti nell'anno di impianto superiori ai 250 kg/ha di  $P_2O_5$  e a 300 kg/ha di  $K_2O$ .

#### **Fertirrinet**

Si ricorda che è disponibile l'applicativo [FERTIRRINET](#) per la gestione della fertirrigazione per le colture di mais, pomodoro, patata e pero (vedi capitolo Irrigazione).

## **GESTIONE DEL SUOLO**

### **LAVORAZIONI E COPERTURA DEL SUOLO**

#### **Appezzamenti con pendenza media inferiore al 10%:**

Colture erbacee: nessun vincolo;

Colture arboree: è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; tale impegno non si applica nei primi 2 anni di impianto. Inoltre, sono consentite le operazioni di semina ed interrimento del sovescio.

#### **Appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%:**

Colture erbacee: sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo e, tra i metodi tradizionali, le lavorazioni fino ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali è consentita una profondità massima di 50 cm.

È obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.

Colture arboree: è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci).

Le operazioni di semina ed interrimento del sovescio sono ammissibili ma il sovescio andrà eseguito a filari alterni.

Nei primi due anni di impianto della coltura l'impegno dell'inerbimento si può applicare anche a filari alterni.

**Appezzamenti con pendenza media superiore al 30%:**

Colture erbacee: sono ammesse esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e, tra i metodi convenzionali di lavorazione la ripuntatura fino ad un massimo di 30 cm di profondità;

Colture arboree: è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci.

All'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali (lavorazioni utili per la sola messa a dimora delle piante) o altre lavorazioni finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nei primi due anni di impianto della coltura l'impegno dell'inerbimento si può applicare anche a filari alterni.

**A prescindere dalla pendenza**, quando esiste il vincolo dell'inerbimento dell'interfila nelle colture arboree, sono comunque ammessi gli interventi localizzati lungo la fila per l'interramento dei fertilizzanti.

NB: Si ricorda che gli appezzamenti di pendenza media superiore al 10% devono essere identificati e che a tale scopo può essere utilizzato il webgis delle particelle presente nell'[Anagrafe delle Aziende Agricole](#). Copia di tale documento deve essere disponibile in azienda. E' comunque consentito calcolare la pendenza media dell'appezzamento attraverso l'analisi di mappe quotate da parte di un tecnico, secondo le indicazioni riportate al cap. 9 delle Norme Generali.

**AVVICENDAMENTO CULTURALE**

**Le aziende con impegni annuali** (es. programmi operativi settore ortofrutta e patata ex OCM ortofrutta) devono rispettare tutti i vincoli di intervallo minimo e di successione colturale riportati nelle Norme tecniche di ogni singola coltura. Per le colture che hanno intervalli di non ritorno superiori all'anno è necessario indicare le precessioni avvenute al fine di poter verificare il rispetto dei vincoli.

**In caso di impegni poliennali** le aziende devono adottare, per le colture principali, una successione minima quinquennale. Nel quinquennio devono essere inserite almeno tre colture principali diverse ed è possibile effettuare al massimo un ristoppio per appezzamento delle sole colture per il quale è consentito (indicate nell'allegato 1 e nelle norme di coltura). La regola delle tre colture principali diverse in cinque anni deve essere rispettata sempre nel corso di tutti gli anni di impegno in caso di impegno poliennale, sia in caso di introduzione che di mantenimento. Ogni anno devono essere rispettati anche i vincoli specifici riportati nelle Norme tecniche di coltura che riguardano le precessioni e le successioni consentite e gli intervalli di non ritorno. Per le colture che hanno destinazione a produzione di seme, non è ammesso il ristoppio.

Le colture non soggette ad aiuto (colture senza il disciplinare di produzione) vengono prese in considerazione al fine del rispetto delle norme di successione colturale.

Il Maggese è considerata una coltura principale, è possibile ripeterlo e non viene considerato un ristoppio.

La superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale inerenti la rotazione stessa e/o ad altri fattori.

**Le colture intercalari o di secondo raccolto non vengono considerate ai fini del piano di rotazione** e quindi non vengono prese in considerazione nel conteggio delle tre colture diverse nel quinquennio e non modificano neanche i vincoli di successione tra le colture principali.



Se tali colture appartengono alla famiglia delle leguminose, se ne deve tener conto ai soli fini del piano di fertilizzazione.

Le colture da sovescio non vengono considerate ai fini della successione colturale. Se le colture intercalari o di secondo raccolto o da sovescio precedono o seguono in due anni consecutivi la stessa specie impiegata come coltura principale, l'avvicendamento costituisce un ristoppio.

Si precisa che è necessario rispettare comunque i vincoli di successione e gli intervalli minimi riportati nelle Norme tecniche di coltura (ad esempio il fagiolo di secondo raccolto non deve precedere il colza, la soia e il girasole).

**Ulteriori indicazioni sono riportate nelle Norme Generali** al Capitolo 7, nelle norme specifiche di ciascuna coltura/gruppo di colture al capitolo avvicendamento colturale; il riepilogo dei principali elementi normativi per l'avvicendamento colturale è anche riportato in **Allegato 1 alle Norme generali**.

## IRRIGAZIONE

**Laddove si verifichino precipitazioni maggiori ai 30 mm tra il 15 e il 19 luglio, si consiglia di sospendere le irrigazioni.**

È ammessa l'irrigazione su tutte le colture, su tutti i terreni e con tutti i metodi irrigui ammessi dai Disciplinari di Produzione Integrata.

Di seguito si elencano le perdite per evapotraspirazione per ciascuna coltura:

- Fragola Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 3,5 mm
- Melone Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 4 mm
- Cocomero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 4mm
- Aglio Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3
- Cipolla Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3
- Patata Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,5
- Pomodoro da industria Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3.5
- Bietola da zucchero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Bietola da seme Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Mais Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Erba medica Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Prato stabile Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Fagiolino Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3

### Arboree

| COLTURA          | INTERFILARE INERBITO | INTERFILARE LAVORATO | NOTE |
|------------------|----------------------|----------------------|------|
| POMACEE          | 5                    | 4,5                  |      |
| ALBICOCCO-SUSINO | 4,5                  | 3,5                  |      |
| CILIEGIO         | 4,5                  | 3,5                  |      |
| PESCO            | 3,5                  | 2,5                  |      |
| VITE             | 3,5                  | 3                    |      |
| ACTINIDIA        | 4                    | 3,5                  |      |

**Nei vigneti e negli arboreti** è possibile effettuare un intervento di soccorso negli impianti giovani.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 45 mm su susino con interfilare inerbito determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (45/4,5)

La fertirrigazione degli impianti arborei a partire già dall'anno di impianto è necessaria per favorire l'ottimale sviluppo della pianta, in particolar modo dell'apparato radicale. Si invitano pertanto tecnici e agricoltori a preparare adeguatamente gli impianti fertirrigui fin da ora, effettuando le dovute manutenzioni.

Si invitano tecnici e agricoltori a rilevare o stimare l'acqua disponibile nel terreno. Ove non sia sufficiente è possibile irrigare tutte le colture, anche, ovviamente, le colture protette. Per calcolare i volumi corretti di acqua da distribuire si suggerisce l'uso di sistemi di supporto decisionale, come, per esempio, Irrinet.

Per approfondire le modalità di calcolo dell'acqua disponibile, per toccare con mano sensori e centraline meteo, per vedere in azione gli impianti irrigui più innovativi o semplicemente per fare domande sulla propria situazione irrigua aziendale, l'Area dimostrativa delle tecnologie irrigue di Acqua Campus sarà aperta su prenotazione dal 31 marzo 2026, contattando Gioele Chiari al 3497504961. L'area è stata implementata di nuove tecnologie grazie anche al GOI Regionale Acqua Smart, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Le norme relative alla irrigazione sono riportate al Capitolo 12 delle Norme generali dei disciplinari di produzione integrata e nelle singole schede di coltura.

È inoltre disponibile l'applicativo [FERTIRRINET](#) per la gestione della fertirrigazione per le colture di mais, pomodoro, patata e pero. Il servizio è presente in IrriNet e fornisce un consiglio di fertilizzazione a norma DPI e permette anche la registrazione anch'essa a norma delle operazioni eseguite. L'applicazione tiene conto del tipo di coltura, fase fenologica, tipo di suolo, condizioni meteo rilevate e previste, oltre che delle irrigazioni e fertilizzazioni eseguite (incluse le eventuali fertilizzazioni ordinarie), nonché coltura precedente.

Al servizio si accede, per i nuovi utenti, previa registrazione attraverso il link: [IrriNet Emilia Romagna](#).

Per chi è già utente IrriNet è sufficiente inserire i seguenti input richiesti per ottenere il calcolo: "Dati chimici del suolo" e "Dati della coltura per la fertirrigazione".

## DATI DI FALDA

I dati di profondità della falda ipodermica nei suoli della pianura dell'Emilia-Romagna sono consultabili presso la pagina [FaldaNet-ER](#) del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo CER.

## **DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

#### **PATENTINI FITOSANITARI**

Dal primo settembre 2022 i rilasci e i rinnovi dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentini fitosanitari) sono dematerializzati e il codice QR sostituisce il patentino cartaceo. Per maggiori informazioni consultare il link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/difesa-sostenibile/uso-sostenibile/patentino/il-nuovo-patentino-fitosanitario-dematerializzato>

#### **TRATTAMENTI IN FIORITURA**

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale del 04 marzo 2019 n. 2, inerente "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna", le prescrizioni per i trattamenti in fioritura sono come di seguito riportate:

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

Per consultare l'intera normativa [BURERT n 64 del 04 marzo 2018](#).

#### **Reti di copertura**

Si ricorda che la messa in opera delle reti antigrandine o delle reti antinsetto durante la fioritura delle piante arboree provoca danni alle api perché vengono intrappolate dalle reti stesse ma anche perché vengono disorientate dalle modificazioni ambientali. Effettuare queste operazioni dopo la fioritura.

#### **APPROFONDIMENTI (MITIGAZIONE DELLA DERIVA, MACCHINE IRRORATRICI E AGRICOLTURA BIOLOGICA)**

Si segnala che al seguente link sono reperibili alcuni approfondimenti tecnici riguardanti le macchine irroratrici, l'agricoltura biologica e la mitigazione della deriva:

[Approfondimenti - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#)

## **CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE DELLE IRRORATRICI**

Il controllo e la regolazione delle irroratrici devono essere eseguiti presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1862/2016.

Le aziende agricole in produzione biologica che applicano la Misura 11 del PSR 2014-20 e la Misura 214 – Azione 2 del PSR 2007-13, devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci, al controllo funzionale ed alla regolazione strumentale volontaria (“regolazione strumentale”), come definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

**Per le aziende che aderiscono allo SRA29 a partire dal 1/1/2023 l’obbligo della regolazione delle irroratrici non è più in vigore;** nonostante questa indicazione la regolazione delle irroratrici è fortemente consigliata. **L’obbligo della regolazione permane per le aziende aderenti alla SRA19 – Azione 1.**

**Nota:** sulla base di disposizioni assunte a livello regionale, si segnala che il collaudo dell’irroratrice dopo scadenza dell’attestato di conformità può essere rimandato a condizione che le previste operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale risultino attuate prima di qualsiasi trattamento eseguito successivamente alla scadenza dell’attestato stesso.

Ne deriva che **nessun trattamento fitosanitario può essere eseguito con attestato di conformità scaduto.**

## **DEROGHE AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA**

Le deroghe concesse per la difesa integrata volontaria sono disponibili al link:

[Deroghe territoriali 2026 - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#)

Allo stesso link è visualizzabile la tabella degli usi eccezionali che non richiedono la concessione di una deroga, tabella che sarà definita e aggiornata di volta in volta che saranno concessi usi eccezionali.

In data 9 luglio u.s. (Prot. 09.07.2026.0681583), si concede per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna l'uso eccezionale, autorizzato in deroga dal Ministero della Salute, per l'impiego del prodotto fitosanitario “MONITOR®” contenente la s.a. sulfosulfuron, da applicare nella fase di post-raccolta della patata e del pomodoro, per il controllo dell'infestante *Cyperus* spp. - impiego consentito dal 22 giugno 2026 fino al 19 ottobre 2026.

In data 11 giugno 2026 è stata concessa la deroga per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna la deroga per l'impiego della sostanza attiva lambda-cialotrina per la difesa dalla cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulla coltura dell'actinidia.

In data 8 giugno 2026 è stata concessa la deroga per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna la deroga per l'impiego della sostanza attiva rame metallo + metalaxil M per il contenimento della peronospora sulla barbabietola da zucchero (coltura portaseme).

In data 4 giugno 2026 è stata concessa la deroga per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della sostanza attiva exitiazox per la difesa delle colture del nettarino e del susino dal ragnetto rosso.

In data 22 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego del prodotto fitosanitario LASER 120 SC contenente la s.a. spinosad per il controllo delle infestazioni di cavallette (*Calliptamus italicus*) sulle colture di erba medica e trifoglio, anche da seme, e prati di leguminose - impiego consentito dal 7 maggio 2026 fino al 3 settembre 2026.

In data 20 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. fludioxinil + ciprodinil per il contenimento della muffa grigia (*Botrytis cinerea*) sulla coltura del mirtillo.

In data 13 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. lambda-cialotrina per il controllo delle infestazioni di afidi sulla coltura del prezzemolo (pieno campo).

In data 13 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale del prodotto fitosanitario FOLPEC 50 SC, contenente la sostanza attiva folpet, per il contenimento della maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) sulla coltura del pero - impiego consentito dal 28/04/2026 al 25/08/2026.

In data 8 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. acetamiprid per il controllo delle infestazioni di afidi sulla coltura del cavolo a testa.

In data 7 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di massimo 2 interventi con la sostanza attiva fluazinam per il contenimento della necrosi apicale bruna sulla coltura del noce.

In data 6 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. acetamiprid per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulla coltura del noce.

In data 6 maggio è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale del prodotto fitosanitario FOLDER 80 WG, contenente la sostanza attiva folpet, per il contenimento della maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) sulla coltura del pero - impiego consentito dal 28/04/2026 al 25/08/2026.

In data 5 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale dei prodotti fitosanitari KESTREL ed EPIK SL contenenti la s.a. acetamiprid per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulla coltura del nocciolo - impiego consentito dal 28 aprile 2026 fino al 25 agosto.

In data 4 maggio 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale del prodotto fitosanitario NANDO MAXI, contenente la sostanza attiva fluazinam, per il contenimento della necrosi grigia sulla coltura del nocciolo - impiego consentito dal 28/04/2026 al 25/08/2026.

In data 30 aprile 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. acetamiprid per il controllo delle infestazioni di afidi sulle colture da seme di barbabietola da zucchero e cavoli.

In data 29 aprile 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. mandipropamid+oxathiapipronil per il contenimento della peronospora (*Peronospora destructor*) sulla coltura della cipolla.

In data 9 aprile 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego, a partire dalla fase di fine fioritura, del prodotto fitosanitario MOVENTO 48 SC 2026, contenente la sostanza attiva spirotetramat, per la difesa dalle cocciniglie farinose *Planococcus ficus* e *Pseudococcus comstocki* sulla coltura della vite - impiego consentito dal 01/04/2026 al 29/07/2026.

In data 31 marzo 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale del prodotto fitosanitario DELEGATE 26 contenente la s.a. spinetoram per la difesa dai seguenti insetti sulle relative colture: psilla (*Cacopsylla pyri*) sulla coltura del pero; moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) sulle colture di albicocco e ciliegio; margaronia (*Palpita unionalis*) sulla coltura dell'olivo - impiego consentito dal 30 marzo 2026 fino al 28 luglio 2026.

In data 23 marzo 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale del prodotto fitosanitario AURA 2026 (s.a. profoxydim) per il controllo dei giavoni sulla coltura del riso – impiego consentito a partire dal 1 aprile 2026 fino al 29 luglio 2026.

In data 16 marzo 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale del prodotto fitosanitario MOVENTO 48 SC 2026 contenente la s.a. spirotetramat – impiego consentito dal 1° aprile 2026 fino al 29 luglio 2026.

Le colture e le rispettive avversità per le quali si concede la deroga sono le seguenti: melo: afide lanigero del melo (*Eriosoma lanigerum*); pero: psilla del pero (*Cacopsylla pyri*); pesco: cocciniglie (*Comstockaspis perniciosa*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus comstocki*); susino: cocciniglie (*Comstockaspis perniciosa*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus comstocki*); ciliegio: afide nero (*Myzus cerasi*) – effettuare massimo 1 trattamento; albicocco: afidi (*Myzus persicae*, *Hyalopterus amygdali*); kaki: cocciniglia (*Pseudococcus viburni*) - effettuare massimo 1 trattamento; actinidia: cocciniglia (*Pseudaulacaspis pentagona*) - effettuare massimo 1 trattamento; pomodoro (coltura in pieno campo): eriofide rugginoso (*Aculops lycopersici*) - effettuare massimo 1 trattamento; melanzana (coltura in pieno campo): afidi (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*); melone (coltura in pieno campo): afidi (*Aphis gossypii*); cipolla (coltura in pieno campo): tripidi (*Thrips tabaci*); cavoli a testa (coltura in pieno campo): afidi (*Myzus persicae*); lattuga, cicoria, indivia riccia e scarola, radicchio: afidi (*Myzus persicae*, *Nasonovia ribis-nigri*) rucola, colture baby leaf di rucola, cicorino e radicchio da taglio, foglie e germogli di brassica, bietola da foglia, spinacino: afidi (*Myzus persicae*); coture baby leaf di dolcetta e lattughino: afidi (*Myzus persicae*, *Nasonovia ribis-nigri*).

In data 16 marzo 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. deltametrina per la difesa dalle nottue fogliari sulla coltura dello spinacio.



## **REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI**

Le seguenti sostanze attive sono state revocate, i formulati commerciali contenenti queste sostanze potranno essere impiegati entro le date riportate:

### Scadenze 2025:

- **Spiromesifen:** utilizzo entro il 31 marzo 2025
- **Dimetomorf:** utilizzo entro il 20 maggio 2025
- **Mepanipyrim:** utilizzo entro il 20 maggio 2025
- **Acibenzolar-S-methile:** utilizzo entro il 10 luglio 2025
- **Spirotetramat:** utilizzo entro il 30 ottobre 2025
- **Tritosulfuron:** utilizzo entro il 7 novembre 2025
- **Metribuzin:** utilizzo fino al 24 novembre 2025
- **Spinetoram:** utilizzo entro il 30 dicembre 2025

### Scadenze 2026:

- **Fenpyrazamie:** utilizzo entro il 15 gennaio 2026
- **Bacillus pumilus:** utilizzo entro il 28 febbraio 2026
- **Flufenacet** utilizzo entro il 10 giugno 2026
- **Metaflumizone** utilizzo entro il 30 giugno 2026
- **Meptyldinocap** utilizzo entro il 30 settembre 2026

## **REVISIONE EUROPEA DEL RAME**

A seguito all'entrata in vigore del Reg UE 2025/1489 l'autorizzazione all'immissione in commercio della sostanza attiva è prorogata al 31 giugno 2029.

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-climatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. **Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno**”

Se si utilizzano prodotti fertilizzanti contenenti rame metallico (Cu) la quantità distribuita deve essere registrata perché concorre al raggiungimento del limite previsto dalle norme fitosanitarie (tali quantitativi devono essere indicati nelle schede di registrazione della difesa e tali registrazioni devono essere conservate per almeno 7 anni).

Per chi aderisce all'intervento SRA19, Azione 2 (limitazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione) il rame è escluso da tale conteggio.

## **SOSTANZE CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE DELLE PIANTE**

La lista dei formulati commerciali di sostanze corroboranti-potenziatori delle difese delle piante approvati dalla Commissione tecnico-consultiva corroboranti del MASAF per l'impiego in agricoltura, sono consultabili nella sezione della banca dati prodotti fitosanitari del SIAN al link <https://www.sian.it/mimfFitoPub/home.get>.

Il DM 0242742 del 30 maggio 2024 prevede l'obbligo di indicare in etichetta del prodotto per quale metodo di agricoltura ne sia possibile l'impiego: PUO' ESSERE IMPIEGATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA; NON PUO' ESSERE IMPIEGATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.

## **LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO FLAVESCENZA DORATA**

Il Settore fitosanitario e difesa delle produzioni ha stabilito le misure di lotta obbligatoria da attuare in Emilia-Romagna per contenere la diffusione della Flavescenza dorata della vite. Le misure di lotta sono contenute nella Determinazione n. 9818 del 20/05/2026 disponibile al link [Prescrizioni per la lotta contro Flavescenza dorata della vite - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#)

Gli interventi obbligatori riguardano:

- l'estirpo di ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, (senza necessità di analisi), nelle aree vitate presenti nelle aree definite come **zona infestata** e di quelle sintomatiche presenti nelle aree vitate delle **zone cuscinetto** e del restante territorio in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata (confermate da analisi di laboratorio)
- I trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* con che dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dalla sopra richiamata Determinazione a partire dal 3 giugno 2026 e comunque non prima della completa sfioritura della vite e dopo avere sfalcato le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura; nei vigneti a conduzione integrata (2 trattamenti obbligatori) il primo trattamento dovrà essere realizzato entro il 18 giugno e il secondo entro e non oltre il 31 luglio 2026; nei vigneti a conduzione biologica e nei vigneti a conduzione integrata in cui vengono impiegate sostanze attive ammesse in biologico (3 trattamenti obbligatori) il primo trattamento dovrà essere realizzato entro il 15 giugno, il secondo entro il 30 giugno e il terzo entro e non oltre il 15 luglio 2026; nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai il terzo trattamento dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31 agosto 2026. Si precisa che nel caso di utilizzo di sostanze attive ammesse in biologico si dovrà seguire quanto indicato per le aziende viticole.

I momenti precisi e i consigli tecnici per effettuare gli interventi sono riportati nella "parte specifica" – vite

## **PARTE SPECIFICA**

### **BOLLETTINI MODELLI PREVISIONALI MONITORAGGI AEREOBIOLOGICI**

Sono disponibili alle seguenti pagine i report redatti periodicamente per i fitofagi e le malattie fungine e batteriche.

- [Fitofagi](#)
- [Malattie fungine e batteriche](#)

### **GRANDINATE**

A seguito di grandinate può essere eseguito un intervento disinfettante con uno dei fungicidi già ammessi per ciascuna coltura. Tale intervento non incide nel numero massimo di fungicidi ammessi. Fare attenzione ai vincoli di etichetta.

### **INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CIMICE ASIATICA (HALYOMORPHA HALYS)**

Utilizzando il seguente link è possibile visualizzare i dati delle catture di cimice asiatica nelle trappole di monitoraggio presenti in Emilia-Romagna: [BIG: Monitoraggio Halyomorpha halys in Emilia-Romagna \(unibo.it\)](http://BIG: Monitoraggio Halyomorpha halys in Emilia-Romagna (unibo.it))

### **Settimana 6 luglio – 12 luglio 2026**

Dopo diverse settimane di calo, le catture di adulti risultano nuovamente in aumento. Pur mantenendosi ancora inferiori al primo picco stagionale registrato nel mese di maggio, confermano il progressivo incremento della presenza degli adulti di prima generazione. La comparsa degli adulti di nuova generazione risulta anticipata rispetto alla media storica e in linea con quanto osservato nel 2025. Le catture delle forme giovanili si mantengono sostanzialmente in linea con la settimana precedente. Le neanidi hanno probabilmente superato il primo picco stagionale e non si osserva ancora un chiaro incremento delle nuove neanidi derivanti dalle uova di seconda generazione. I monitoraggi attivi confermano nel complesso una presenza contenuta sul territorio. Le segnalazioni di danni rimangono limitate sulle drupacee in raccolta e generalmente circoscritte alle situazioni caratterizzate da fattori predisponenti alla presenza della cimice.

### **Previsioni e consigli per la settimana dal 13 al 19 luglio**

Le simulazioni del modello HHAL-S prevedono un ulteriore incremento della presenza di adulti di prima generazione e un deciso aumento della deposizione delle uova di seconda generazione. Le forme giovanili dovrebbero mantenersi inizialmente su livelli stabili, con un progressivo incremento atteso dalla fine del periodo per effetto della comparsa delle prime neanidi di seconda generazione. Pur in presenza di una situazione che al momento appare generalmente buona, si raccomanda di proseguire con attenzione i monitoraggi aziendali per intercettare tempestivamente eventuali spostamenti di adulti provenienti da colture in raccolta o da aree non gestite. Su però la situazione risulta nel complesso sotto controllo, ma la prolungata suscettibilità della coltura rende opportuno mantenere elevata l'attenzione, in particolare negli impianti più vigorosi e con vegetazione fitta, nelle aree caratterizzate da popolazioni storicamente elevate o in prossimità di siepi, boschetti e altri elementi favorevoli alla presenza della cimice.

## **MONITORAGGIO DELLE CAVALLETTE**

Con i sopralluoghi effettuati in questi giorni sono state rilevate le prime neanidi della cavalletta dei prati, nota altresì come Cavalletta italiana (*Calliptamus italicus*) nei campi sentinella delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, aree già interessate da infestazioni negli anni precedenti.

Con questi primi ritrovamenti si apre la fase di massima attenzione per l'individuazione dei focolai iniziali e la realizzazione di interventi localizzati. Si raccomanda di concentrare le attività di monitoraggio nei terreni che negli anni scorsi hanno registrato elevate infestazioni.

Si ricorda che la strategia della Regione Emilia-Romagna per la lotta e il contenimento delle cavallette è basata sulla prevenzione e punta all'individuazione dei luoghi di nascita (le cosiddette "grillare") su cui devono essere realizzati interventi insetticidi mirati da effettuare quando le cavallette sono ancora piccole, prive di ali e concentrate su piccole superfici. Questi interventi preventivi, realizzati con insetticidi biologici (ad es. Spinosad o piretro naturale) fra metà maggio e la fine di giugno, evitano una successiva dispersione delle cavallette sul territorio, limitando i danni alle coltivazioni.

A tal fine si segnala che, con Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2026, è stato autorizzato l'uso in emergenza del formulato LASER 120 SC (Spinosad) su erba medica, trifoglio e leguminose foraggere, contro la cavalletta crociata (*Dociostaurus maroccanus*) e la cavalletta italiana

(*Calliptamus italicus*), per un periodo di 120 giorni (7 maggio – 3 settembre 2026). Tale formulato è impiegabile anche per le aziende che seguono i disciplinari di produzione integrata della regione Emilia-Romagna.

## **COLTURE ARBOREE**

### **TECNICHE AGRONOMICHE**

Per le note specifiche relative alla fertilizzazione delle colture rimanda alle norme tecniche di coltura in vigore: [Norme tecniche di coltura 2026](#).

Adottando le schede Dose Standard per la concimazione, a seconda della dotazione del terreno, occorre tener presente che i massimali possono differire a seconda che si tratti di **I e II anno di Allevamento** o **Produzione**, come anche in caso di **normale produzione** o **alta produzione**.

#### **COLTURE ARBOREE:**

**Concimazione in pre impianto:** non sono ammessi apporti di concimi azotati minerali prima della messa a dimora delle piante.

**Concimazione d'allevamento (1° e 2° anno):** sono ammessi solo apporti localizzati di fertilizzanti. Le quantità di macroelementi distribuite devono essere ridotte rispetto alla dose massima prevista nella fase di produzione; in particolare, in condizioni di normale fertilità del terreno, non si possono superare i limiti della Dose Standard N-P-K.

Adottando le schede Dose Standard per la concimazione, a seconda della dotazione del terreno, occorre tener presente che i massimali possono differire a seconda che si tratti di **normale produzione** o **alta produzione**.

### **VITE**

#### ***Tecniche Agronomiche***

Sono ammessi impieghi di concime di sintesi, minerale o organico tra le fasi fenologiche “gemma cotonosa” e “allegagione”. Tra la fase di allegagione e la raccolta si può concimare solo se si pratica la fertirrigazione o la concimazione fogliare.

#### ***DISERBO ARBOREE***

Il diserbo chimico è ammesso solo in bande sottofila per una superficie massima pari al 30% della superficie totale (da piano colturale). L'eliminazione delle infestanti nello spazio fra le file (es. distruzione cotico erboso nel pero) può essere realizzato solo con metodi non chimici (lavorazioni, pirodiserbo).

#### **Erbicidi totali-sistemici**

Glifosate, attivo sulla quasi totalità delle infestanti graminacee e dicotiledoni. Buona parte delle popolazioni di *Conyza* spp sono resistenti a glifosate.

Limite di impiego del glifosate (riferito a formulati a 360 g/l):

### Impianti in produzione:

- 9 lt/anno per ettaro trattato (= 2,7 lt/anno sul 30% della superficie totale) se non si usano anche erbicidi residuali;
- 6 lt/anno per ettaro trattato (= 1,8 lt/anno sul 30% della superficie totale) se si usano anche erbicidi residuali (norma che non si applica al noce).
- Glifosate + 2,4-D (laddove consentito) per un miglior controllo di dicotiledoni perenni

### Impianti in allevamento:

- 9 lt /anno per ettaro trattato;

### **Spollonante**

- NAA: autorizzato come spollonante su nocciolo. Questo trattamento deve essere effettuato quando i polloni hanno raggiunto un'altezza di 20-30 cm.

### **Spollonante/Erbicida graminicida e dicotiledonica**

- Acido Pelargonico: autorizzato come spollonante ed erbicida per vite e vari fruttiferi.
- Glifosate + 2,4-D: autorizzato formulato specifico per olivo

### **Spollonanti/Erbicidi dicotiledonici (azione di contatto)**

Per infestanti di dicotiledoni ai primi stadi vegetativi e per il controllo dei polloni si possono utilizzare:

- Carfentrazone: autorizzato per actinidia, melo, pero, pesco, susino, vite, nocciolo e olivo. Prodotto di contatto attivo sia nei confronti dei polloni che delle infestanti dicotiledoni ai primi stadi di sviluppo.
- Pyraflufen etile: autorizzato per actinidia, albicocco, ciliegio, kaki, melo, pero, pesco, susino, vite, nocciolo e olivo. Prodotto di contatto attivo sia nei confronti dei polloni che delle infestanti dicotiledoni ai primi stadi di sviluppo.

### **Erbicidi dicotiledonici**

Prestare attenzione alle temperature al fine di evitare cali di efficacia

- MCPA: autorizzato per pomacee e vite. Prodotto sistemico attivo anche su dicotiledoni perenni
- 2,4-D: autorizzato su drupacee - periodo consigliato di applicazione giugno-luglio – su noce e nocciolo entro lo stadio di fine fioritura.
- Fluroxipir: autorizzato per pomacee, drupacee, noce, nocciolo e olivo. Prodotto sistemico attivo anche su dicotiledoni perenni.
- Halauxifen-methyl autorizzato su olivo in miscela con Fluroxipir.

### **Erbicidi graminicidi**

Per infestanti graminacee si possono utilizzare questi erbicidi:

| Sostanza attiva | Culture autorizzate |
|-----------------|---------------------|
| Ciclossidim     | Pomacee-vite        |

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clethodim          | Pesco-albicocco-susino-ciliegio-vite-pomacee-actinidia-noce-nocciolo-kaki-olivo          |
| Fluazifop-p-butile | Pesco-albicocco-susino-ciliegio-vite-pomacee-actinidia-noce-nocciolo-kaki-mirtillo-olivo |
| Propaquizafop      | Albicocco-susino-ciliegio-pomacee-noce-nocciolo-pesco-vite                               |
| Quizalofop-p-etile | Albicocco-susino-ciliegio-pomacee-noce-nocciolo-pesco-vite-mirtillo                      |

### **Molecole candidate alla sostituzione (CS)**

Pendimetalin, Diflufenican, Oxyfluorfen e Propizamide, in quanto sostanze attive candidate alla sostituzione sono sottoposte ad una particolare regolamentazione. Negli impianti in produzione è ammesso l'utilizzo di una sola di queste molecole. Per la sola specie **pero** vi è la possibilità di usare due di queste molecole. L'uso di molecole CS non impatta sull'utilizzo degli altri erbicidi residuali.

## **Difesa arborea**

### **MELO**

#### **Fase fenologica:** accrescimento frutti

**Colpo di fuoco batterico:** in caso di forti temporali e/o eventi grandinigeni si consiglia di intervenire entro le 24 ore con Prodotti rameici; attenzione alla fitotossicità del rame: sconsigliato l'impiego sulle varietà del gruppo Pink lady e Fuji, trattare a pianta asciutta e distanziare da eventuali applicazioni di concimi fogliari. oppure impiegare preventivamente *Bacillus amyloliquefaciens* o *Aureobasidium pullulans* o *Bacillus subtilis*. Nel caso di utilizzo *Aureobasidium pullulans* si ricorda di fare attenzione alle raccomandazioni di impiego.

Intervenire asportando tutti gli organi colpiti tagliando ad almeno 70 cm al di sotto del punto d'ingresso del batterio per arrestarne la diffusione lungo i vasi legnosi e provvedere alla disinfezione degli attrezzi utilizzati.

**Ticchiolatura:** si raccomanda di verificare con attenzione in campo la presenza di eventuali sintomi. In caso di presenza di ticchiolatura si consigliano interventi stoppanti con Polisolfuro di Calcio o Bicarbonato di Potassio o come corroborante Estratto integrale di Castagno a base di tannino o Dodina (Max 2) o Captano (Max 10) o Sali di Rame quest'ultimo fitotossico su gruppo Pink

#### **(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

Tra Ditianon e Captano Max 18 interventi.

**Oidio:** sulle varietà piu' ricettive e nelle aree a maggior rischio intervenire preventivamente con Zolfo intervento efficace anche nei confronti di patina bianca o negli altri casi attendere la comparsa dei



primi sintomi e in caso di presenza intervenire con Bicarbonato di potassio attivo anche su Ticchiolatura e Glomerella.

**Glomerella:** al momento non si segnalano sintomi accertati in campo. Proseguono i controlli ed i monitoraggi. In caso di piogge con prolungate bagnature (di almeno 10-12 ore) e temperature media da 16°C a 34°C (optimum 26-28°C) potrebbero innalzare il rischio infettivo. Nelle aziende che hanno concluso la difesa alla ticchiolatura ma che riscontrano le condizioni ottimali di sviluppo della malattia sopradescritte, considerare anche le ore di bagnatura da irrigazione, intervenire con Ditianon o Fluodioxinil (Max 2 trattamenti) In caso si protragga la difesa verso ticchiolatura preferire Fluazinam, Captano, Bicarbonato di potassio e Zolfo, che manifestano efficacia nel contenimento del patogeno.

Tra Ditianon e Captano Max 18 interventi.

**Eulia:** il modello previsionale segnala che gli sfarfallamenti degli adulti della III generazione sono iniziati in quasi tutte le aree (0-8%); nelle aree più calde è in avvio l'ovideposizione (0-3%). Sono ancora presenti larve della generazione precedente (85-61%) che si stanno progressivamente impupando e, da metà della prossima settimana, è atteso l'inizio della nascita delle larve di III generazione nelle aree più calde. Normalmente non sono necessari interventi con questo fitofago. Se non si è ancora provveduto, cambiare i fondi e i feromoni nelle trappole per il monitoraggio del III volo.

**Carpocapsa:** il modello previsionale segnala la coda degli sfarfallamenti e presenza di adulti di II volo in calo (adulti ancora presenti 85-65%). L'ovideposizione varia dall'86 al 95% e la nascita larvale dal 69 all' 85%. In caso di catture o al superamento dello 0,5% di frutti bacati ( su un campione di 500 frutti/ha) proseguire la difesa intervenendo con Virus della granulosi o Spinosad (Max 3) o **Emamectina (\*)** (Max 3) o **Etofenprox (\*)** (Max 2) quest'ultimo efficace anche per il controllo di cimice.

Tra Piretrine e Piretroidi Max 5 all'anno

**Afide lanigero:** momento caratterizzato da calo di presenza di *Aphelinus m.* e di *Eriosoma l.* Monitorare la presenza dell'afide. Al superamento della soglia di 10 colonie vitali su 100 organi controllati con infestazione in atto intervenire con **Pirimicarb (\*)**, attivo contro l'**afide grigio e verde** e/o fare lavaggi con Sali potassici di Acidi grassi.

(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione

**Cemiostoma:** situazione mediamente buona. Inizio terzo volo. Verificare la eventuale presenza di mine. Al superamento della soglia di 400 adulti cumulati da inizio volo sulla prima generazione o 20 mine su 100 foglie rilevate in prima generazione intervenire con Acetamiprid o Spinosad (Max 3) o **Emamectina (\*)** (Max 3)

**Litocollete:** situazione mediamente buona. Prosegue il III volo . Continuare a monitorare la presenza sulle foglie di mine. Al superamento della soglia di due mine con larve vive per foglia nella precedente generazione intervenire con Acetamiprid o Spinosad (Max 3)

**Pandemis:** il modello previsionale segnala la prosecuzione degli sfarfallamenti degli adulti di II volo (7-20%) e l'inizio delle ovideposizioni in tutte le aree 2-8%. Sono presenti larve della generazione precedente (71-49%)che si stanno progressivamente impupando e dal fine settimana è atteso l'inizio delle nascite delle larve di seconda generazione nelle aree più calde. Normalmente non sono necessari interventi con questo fitofago.

**Archips:** proseguire il monitoraggio

**Ragnetto rosso:** al superamento della soglia del 90% di foglie occupate dal fitofago e in assenza di predatori intervenire con Exithiazox o Mylbamectina o Pyridaben o **Tebufenpyrad (\*)** (Max 1) o Acequinocyl o Fenpiroximate Cyflumetofan (utilizzabile 1 volta ogni 2 anni) o Sali Potassici di Acidi Grassi o Maltodestrina

Eccetto le ultime 2 sostanze attive elencate Max 2 interventi all'anno

**Cimice asiatica:** le catture di adulti risultano nuovamente in aumento confermando il progressivo incremento della presenza degli adulti di prima generazione. Le catture delle forme giovanili si mantengono sostanzialmente in linea con la settimana precedente. I monitoraggi attivi confermano nel complesso una presenza contenuta sul territorio. Le segnalazioni di danni rimangono limitate sulle drupacee in raccolta e generalmente circoscritte alle situazioni caratterizzate da fattori predisponenti alla presenza della cimice. Proseguire con attenzione i monitoraggi aziendali per intercettare tempestivamente eventuali spostamenti di adulti provenienti da colture in raccolta o da aree non gestite in particolare negli impianti più vigorosi e con vegetazione fitta, nelle aree caratterizzate da popolazioni storicamente elevate o in prossimità di siepi, boschetti e altri elementi favorevoli alla presenza della cimice. Monitorare la presenza in campo e in caso di accertata presenza intervenire con Acetamiprid, oppure impiegare Tau-fluvalinate (Max 2) o Deltametrina (Max 3) o **Etofenprox** (max 2) (\*) o **Lambdacialotrina** (Max 1) (\*) o Flupyradifurone o Tebufenozide (Max 2)

(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione

Tra piretrine e Piretrodi Max 5

**Mosca delle frutta:** al momento i monitoraggi regionali non rilevano catture. Controllare le trappole attrattive per il monitoraggio e in caso di catture installare il sistema attract and kill con Deltametrina o **Lambdacialotrina(\*)** o **Esfenvalerate(\*)**.

## OLIVO

**Fase fenologica:** accrescimento frutto

**Occhio di pavone:** si invitano gli olivicoltori a prestare attenzione alla presenza di questa malattia fungina nei propri oliveti, infatti le numerose piogge che hanno caratterizzato i primi mesi dell'anno e le alte percentuali di umidità che si stanno registrando creano un ambiente favorevole per lo sviluppo di questo patogeno. La malattia è favorita appunto dall'umidità e si manifesta soprattutto nelle parti più basse della chioma, specialmente nelle piante troppo fitte o nelle chiome mal potate. In caso di forte attacco è possibile intervenire con fungicidi specifici come Dodina (Max 2) o Pyraclostrobin (Max 2).

**Rogna dell'olivo:** In seguito ad eventuali grandinate, si raccomanda di effettuare un intervento a base di rame entro le 48 ore dall'evento grandigeno. Tale trattamento permette la disinfezione delle lesioni causate dalla grandine e limita la diffusione della rogna dell'olivo.

**Mosca olearia:** Sono iniziati i monitoraggi della mosca olearia svolti sul territorio regionale coordinati da ARPO. Come per le annate precedenti, sono circa 100 i punti di osservazione distribuiti nelle Province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Modena.

Nelle aziende pilota, i rilievi hanno evidenziato i seguenti dati:

- Volo adulti: catture stazionari
- Livello infestazione: l'ovideposizione risulta assente

Pertanto sono consigliate le seguenti operazioni:

- Le aziende che attuano lotta larvicida, al momento non devono effettuare alcun trattamento.
- Le aziende che attuano il controllo con repellenti (es. caolino) o con esche avvelenate (es. Spinosad): effettuare un trattamento appena possibile
- Le aziende che attuano il controllo della mosca con trappole a cattura massale devono montare i dispositivi appena possibile.

## PERO

---

### Fase fenologica: ingrossamento frutti-maturazione

**Colpo di fuoco batterico:** presenza in campo. In presenza di forti temporali e/o eventi grandinigeni si consiglia di intervenire entro le 24 ore con Prodotti rameici; attenzione alla fitotossicità del rame oppure intervenire con *Bacillus amyloliquefaciens* o *Aureobasidium pullulans* o *Bacillus subtilis* o asportare le fioriture secondarie. Nel caso di utilizzo *Aureobasidium pullulans* si ricorda di fare attenzione alle raccomandazioni di impiego.

Intervenire asportando tutti gli organi colpiti tagliando ad almeno 70 cm al di sotto del punto d'ingresso del batterio per arrestarne la diffusione lungo i vasi legnosi e provvedere alla disinfezione degli attrezzi utilizzati.

**Ticchiolatura:** si raccomanda di verificare con attenzione in campo la presenza di eventuali sintomi. In caso di infezioni in campo si consiglia di mantenere la copertura ed effettuare interventi stoppanti con Polisolfuro di Calcio o Bicarbonato di Potassio o come corroborante Estratti integrale di castagno a base di tannino o Dodina (Max 4) o Captano o Sali di Rame.

Tra Dithianon e Captano Max 16 interventi.

**Maculatura Bruna:** il modello indica sporulazione in corso a seguito delle precipitazioni di sabato scorso. Le piogge di mercoledì favoriranno infezioni a partire dai conidi attualmente presenti. Ulteriori precipitazioni potranno determinare nuovi rilasci conidici e creare condizioni favorevoli alle infezioni. In relazione alla distribuzione delle precipitazioni sul territorio sono attese situazioni di rischio differenziate; nel complesso il rischio si mantiene su livelli medi, con possibili incrementi a livelli elevati nelle aree interessate da piogge frequenti e bagnature ripetute.

Intervenire in corrispondenza di piogge o bagnature prolungate, con Rame o Dithianon o Captano (Max 10) o Dodina (numero di interventi non vincolato per le varietà sensibili a maculatura bruna) o **Difenconazolo (\*)** o Mefentrifluconazolo (Max 2). Si può intervenire con prodotti a base di SDHI come: Fluxapyroxad (Max 3) oppure Fluopyram (Max 3) Per ridurre il rischio dell'insorgenza di fenomeni di resistenza si raccomanda di impiegare i prodotti a base di SDHI e IBE con un partner (se non già presente). o **Fluodioxinil(\*)** (Max 3) o **Cyprodinil (\*)** (Max 3) anch'essi con partner di copertura.

**(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

Tra Dithianon e Captano Max 16 interventi.

Tra gli SDHI (Penthiopyrad, Fluxapyroxad, Boscalid e Fluopyram) Max 4 interventi da eseguire almeno in due blocchi.

Tra gli IBE (Mefentrifluconazolo, Penconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo e Difenconazolo) Max 6 interventi.

Tra Cyprodinil e Pyremetanil (Max 6)

Tra Fosetil Al e Fosfonato di potassio Max 10 interventi.

**Psilla:** situazione eterogenea mediamente buona ma con presenze in alcuni casi importanti. In presenza di melata o quando il rapporto tra numero di getti con psilla e numero di getti con antocoride è maggiore di 5. Intervenire con Olio minerale (fare attenzione alla possibile fitotossicità in combinazione con altri prodotti, tenere il richiesto intervallo ad esempio dai trattamenti con Captano, Fluazinam e Zolfo) intervento efficace nel contrastare il **brusone** fisiologico o Maltodestrina o eseguire lavaggi con Sali potassici di acidi grassi.

**Eulia:** il modello previsionale segnala che gli sfarfallamenti degli adulti della III generazione sono iniziati in quasi tutte le aree (0-8%); nelle aree più calde è in avvio l'ovideposizione (0-3%). Sono ancora presenti larve della generazione precedente (85-61%) che si stanno progressivamente impupando e, da metà della prossima settimana, è atteso l'inizio della nascita delle larve di III generazione nelle aree più calde. Normalmente non sono necessari interventi con questo fitofago. Se non si è ancora provveduto, cambiare i fondi e i feromoni nelle trappole per il monitoraggio del III volo. Normalmente non sono necessari interventi contro questo fitofago.

**Carpocapsa:** il modello previsionale segnala la coda degli sfarfallamenti e presenza di adulti di II volo in calo (adulti ancora presenti 85-65%). L'ovideposizione varia dall'86 al 95% e la nascita larvale dal 69 all'85%. In caso di catture o al superamento dello 0,5% di frutti bacati (su 500 frutti/ha campionati) proseguire la difesa intervenendo con Virus della granulosa o Spinosad (Max 3) o **Emamectina (\*)** (Max 2)

**Pandemis:** il modello previsionale segnala la prosecuzione degli sfarfallamenti degli adulti di II volo (7-20%) e l'inizio delle ovideposizioni in tutte le aree 2-8%. Sono presenti larve della generazione precedente (71-49%) che si stanno progressivamente impupando e dal fine settimana è atteso l'inizio delle nascite delle larve di seconda generazione nelle aree più calde. Normalmente non sono necessari interventi con questo fitofago.

**Archips:** proseguire il monitoraggio.

**Cimice asiatica:** le catture di adulti risultano nuovamente in aumento confermando il progressivo incremento della presenza degli adulti di prima generazione. Le catture delle forme giovanili si mantengono sostanzialmente in linea con la settimana precedente. I monitoraggi attivi confermano nel complesso una presenza contenuta sul territorio. Le segnalazioni di danni rimangono limitate sulle drupacee in raccolta e generalmente circoscritte alle situazioni caratterizzate da fattori predisponenti alla presenza della cimice. Proseguire con attenzione i monitoraggi aziendali per intercettare tempestivamente eventuali spostamenti di adulti provenienti da colture in raccolta o da aree non gestite in particolare negli impianti più vigorosi e con vegetazione fitta, nelle aree caratterizzate da popolazioni storicamente elevate o in prossimità di siepi, boschetti e altri elementi favorevoli alla presenza della cimice.

Monitorare la presenza in campo e in caso di accertata presenza intervenire con Acetamiprid o su varietà a raccolta precoce impiegare Taufluvalinate (Max 2) o **Lambdacialotrina (\*)** (Max 1) o Deltametrina o Tebufenozide (Max 2).

Tra Piretrine e Piretroidi Max 4 interventi all'anno

**(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

**Metcalfa** : presenza adulti . In caso di presenza di melata effettuare lavaggi .

**Ragnetto rosso** (brusone): al superamento del 60% di foglie occupate mentre su William, Conference, Kaiser, Pakam's, Guyot e Butirra precoce Morettini con temperature superiore a 28° la soglia è pari alla presenza intervenire con Exythiazox o Pyridaben o Fenpiroximate o **Tebufenpirad** (\*) (Max 1) o Acyquenocyl o Cyflumetofen (impiegabile ogni 2 anni)

Tranne che per impiego di Maltodestrine o Sali Potassici e *Beauveria bassiana* Max 2 interventi all'anno contro questa avversità.

**VITE**

---

**Fase fenologica:** chiusura grappolo-inizio invaiatura

**Peronospora:** al momento situazione di controllo della malattia buona. L'evasione delle possibili infezioni, relative agli eventi temporaleschi dell'11 luglio, è prevista per il 16-17 luglio. Mentre per la pioggia del 15 attesa la possibile comparsa il 20-21 Luglio

Rinnovare la difesa anticipando le piogge con Rame, intervento efficace anche nei confronti di Black rot ed Escoriosi .

In caso di vegetazione scoperta valutare se intervenire con Cimoxanil ( Max 4 ) in funzione della recettività fenologica.

**Oidio:** situazione complessivamente buona pur con presenza in lieve aumento di sintomi in campo. Intervenire con Zolfo , e/o Bicarbonato di potassio o Olio essenziale di Arancio dolce

**Mal dell'esca:** aumento sintomatologia in campo.

**Flavescenza dorata** : presenza di sintomi in campo. Si raccomanda di ispezionare attentamente i vigneti e di procedere all'estirpo delle piante sintomatiche.

Per i dettagli fare riferimento alle misure di lotta che sono contenute nella Determinazione n. 9818 del 20/05/2026 disponibile al link [Prescrizioni per la lotta contro Flavescenza dorata della vite - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#)

**Tignoletta:** situazione di campo in generale buona. I monitoraggi in campo al momento non evidenziano né l'inizio volo né l'ovideposizione. Il modello previsionale segnala che in tutte le aree sono iniziati gli sfarfallamenti degli adulti di III volo (4-13%) ma è ancora presente il 17-7% di adulti di II volo. Nelle aree più calde stanno iniziando le ovideposizioni delle uova di III generazione (0-5%) ma è ancora presente un 3-2% di uova di II generazione. La nascita delle larve di II generazione ha raggiunto il 93-100% ed è ancora presente il 65-50% di larve di II generazione; a partire dal fine settimana inizierà anche la nascita delle larve di III generazione nelle aree più calde. Se non si è ancora provveduto, cambiare i fondi e i feromoni nelle trappole per il monitoraggio del III volo. Per le indicazioni di difesa si rimanda ai prossimi Bollettini.

**Ricordiamo che eccetto prodotti autorizzati in biologico massimo 2 interventi all'anno.**

**Cocciniglie farinose:** situazione al momento mediamente buona. Presenza primi adulti. Monitorare la situazione in campo per valutare l'eventuale necessità di un intervento da fare in tempi brevi con Olio minerale o Acetamiprid (Max 1) facendo attenzione ai periodi di carenza (Max 1, solo contro *Planococcus ficus*) attivo anche nei confronti della **fillossera** oppure



Flupyradifurone (Max 1) o Sulfoxaflor (uso eccezionale dal 01/05/2026 al 28/08/2026) o In caso di presenza di focolai localizzati intervenire con lanci di *Cryptolaemus m.* e/o effettuare il secondo lancio di Anagyrus

**Scafoideo:** presenza di adulti . Proseguono i monitoraggi territoriali. Installare le trappole cromotropiche gialle per verificare l'efficacia degli interventi fatti allo scafoideo . Ricordiamo In questa fase dopo aver effettuato il secondo intervento con prodotti ad azione abbattente quali Deltametrina (Max 2) o **Etofenprox** o **Lambdacialotrina** o **Esfenvalerate** o Tau-fluvalinate (Max 2). in caso le trappole evidenzino ancora presenza dell'insetto si consiglia di programmare un ulteriore intervento (terzo intervento). Per le indicazioni, per quest'ultimo, attendere i prossimi Bollettini.

Tra Etofenprox, Lambdacialotrina e Esfanvalerate Max 1

tra Piretrine e Piretroidi Max 4

**Ragnetto giallo e rosso:** si suggerisce di monitorare la presenza di infestazioni e in caso di superamento della soglia pari al 60-70% di foglie con forme mobili presenti, intervenire con Exitiazox o **Tebufenpirad (\*)** o Fenpyroximate o Acequinocyl (utilizzabile solo su ragnetto rosso) o Sali potassici degli acidi grassi o Maltodestrina

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno, ad esclusione dei Sali potassici di acidi grassi e Maltodestrina.

(\*) **Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

**Ricordiamo che eccetto prodotti autorizzati in biologico massimo 2 interventi all'anno.**

**Popillia Japonica :** si sconsiglia di installare le trappole di monitoraggio dell'insetto in quanto in grado di richiamarlo anche a grande distanza favorendo lo spostamento in aree non ancora interessate dal fitofago.

### **Difesa insetticida obbligatoria**

Nel 2026, come indicato nella Determinazione del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni n. 9818 del 20/05/2026, nei vigneti a conduzione integrata (obbligatoria e volontaria) dovranno essere effettuati almeno 2 trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati sulla vite contro *Scaphoideus titanus* o cicaline in genere; sarà obbligatorio effettuare 3 trattamenti se vengono impiegate sostanze attive ammesse in biologico. Inoltre nel caso in cui si utilizzino prodotti biologici per più di un trattamento, almeno uno di questi deve essere eseguito con le piretrine naturali.

Qualora si riscontri una presenza rilevante di scafoideo si consigliano ulteriori interventi.

### **Tempistica dei trattamenti obbligatori**

La lotta obbligatoria contro *Scaphoideus titanus* dovrà essere attuata secondo le modalità stabilite dalla sopra richiamata Determinazione a partire dal 3 giugno 2026 e comunque non prima della completa sfioritura della vite e dopo avere sfalciato le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura:

- nei vigneti in cui sono obbligatori 2 trattamenti il primo dovrà essere realizzato entro il 18 giugno e il secondo entro e non oltre il 31 luglio 2026;
- nei vigneti in cui sono obbligatori 3 trattamenti il primo trattamento dovrà essere realizzato entro il 15 giugno, il secondo entro il 30 giugno e il terzo entro e non oltre il 15 luglio 2026.



## Strategia di intervento

Al fine di ottimizzare la difesa aumentando la selettività nei confronti degli organismi utili, riducendo l'insorgenza di resistenze e tenendo conto del meccanismo d'azione dei prodotti, le strategie di difesa indicate dal Settore fitosanitario, anche in considerazione delle linee tecniche riportate nel DTU n. 29 del Comitato Fitosanitario Nazionale approvato il 13/12/2022, delle sperimentazioni effettuate sul nostro territorio e sulla base dei rilievi effettuati sulle forme giovanili di *S. titanus*, fatto salvo quanto sopra riportato, i momenti per la realizzazione degli interventi insetticidi, le sostanze attive da impiegare e il loro posizionamento sono i seguenti:

### Aziende in difesa integrata che impiegano solo prodotti chimici (2 trattamenti obbligatori)

- eseguire il primo trattamento nel periodo che va dal 3 al 13 giugno 2026 con prodotti fitosanitari contenenti una delle sostanze attive ad azione sistemica (acetamiprid, flupiradifurone e sulfoxaflor\*). Non intervenire prima del termine del periodo della fioritura;
- eseguire il secondo trattamento dopo circa 20-30 giorni dal primo con prodotti ad azione abbattente quali i piretroidi (deltametrina, etofenprox, lambdacialotrina, esfenvalerate, tau-fluvalinate)

Nelle fasce di rispetto (dai corpi idrici, dalle piante e dagli artropodi non bersaglio) possono essere impiegati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive silicato di alluminio\* e *Beauveria bassiana*.

### NOTE:

\*il prodotto Closer (s.a. sulfoxaflor) è autorizzato per usi di emergenza (art. 53 del Reg. 1107/2009) dal 01/05/2026 al 28/08/2026. Si sottolinea inoltre che gli eventuali 2 trattamenti a metà dose sono da considerarsi equivalenti ad 1 solo trattamento obbligatorio a dose piena.

\*\*il prodotto SURROUND® WP CROP PROTECTANT (s.a. silicato di alluminio) è autorizzato per usi di emergenza (art. 53 del Reg. 1107/2009) dal 01/04/2026 al 29/07/2026

**Per le aziende in difesa integrata che impiegano 1 o più sostanze attive ammesse in biologico (3 trattamenti obbligatori) [vai alla scheda](#)**

### Accorgimenti per aumentare l'efficacia dei trattamenti

- cimare e sfoltire la vegetazione, in modo da escludere la presenza di germogli ricadenti nell'interfilare o a terra. Queste operazioni vanno effettuate almeno due o tre giorni prima del trattamento, in modo da permettere la risalita sulle viti delle forme giovanili di *S. titanus* cadute a terra;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- effettuare un'accurata bagnatura di tutta la vegetazione, comprese le parti interne e nascoste, nonché i polloni e i ricacci lungo il fusto. A tal fine è necessario utilizzare volumi di acqua elevati (volume minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento atta a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie, dove normalmente

risiede il vettore. Si consiglia di valutare la qualità della distribuzione della miscela insetticida con l'uso delle apposite cartine idrosensibili;

- rispettare tutte le prescrizioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato;
- correggere il pH della soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, di miscelare l'insetticida ad altri prodotti, sebbene compatibili;
- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne;
- praticare la spollonatura con 3 giorni di anticipo rispetto al trattamento, in modo da abbattere anche le forme giovanili in risalita dal suolo.

### **Salvaguardia delle api e dell'entomofauna pronuba**

Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore serali quando l'attività dei pronubi è limitata o assente.

Si sottolinea che sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi o altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi, durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. Tali trattamenti sono inoltre vietati in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi (L.R. n. 2/2019).

## **COLTURE ERBACEE**

### **TECNICHE AGRONOMICHE**

Si ricorda di programmare le fertilizzazioni in coerenza con quanto riportato nel piano di fertilizzazione. In caso d'utilizzo del modello semplificato delle Schede Dose Standard l'azienda è tenuta a registrare le motivazioni di un eventuale incremento o decremento rispetto alla dose standard. Non sono ammesse distribuzioni in copertura con concimi minerali che contengono  $P_2O_5$  e  $K_2O$ .

Ulteriori indicazioni per singola coltura in [Norme Tecniche di Coltura](#).

### **DISERBO ERBACEE**

#### **Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l/ha per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare i dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Si fa presente che le applicazioni di glifosate in pre-semina diventano alternative alle applicazioni in pre-emergenza (nelle colture dove è autorizzato questo impiego, es. bietola, mais, cipolla).

## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

---

**Fase fenologica:** accrescimento fittone

**Difesa**

**Sulla coltura sono ammessi, esclusi il trattamento con geodisinfestanti e con *Bacillus thuringiensis*, al massimo 3 interventi insetticidi all'anno.**

**Cercospora:** presenza della malattia modesta. Proseguire la difesa intervenendo con Prodotti rameici o miscele di rame e Zolfo.

In alternativa è possibile impiegare Tetraconazolo o Protiocanazolo o

Protiocanazolo+**Metconazolo(\*)** o Protiocanazolo+Fluopyram (Max 2) o

Protiocanazolo+Fenpicoxamid (uso eccezionale UNIVOQ dal 20 aprile 2026 al 17 agosto 2026) o

**Difenoconazolo(\*)** o **Difenoconazolo(\*)**+Fenpropidin o Mefentrifluconazolo+Fluxapyroxad (Max 2).

Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno a esclusione di Sali di Rame, Zolfo e *Bacillus subtilis* (4 per gli estirpi successivi al 31/08).

Tra Difenoconazolo e Metconazolo Max 1 intervento – alternativi tra loro

Si consiglia di sospendere gli interventi 30 giorni prima dalla data di raccolta.

## CEREALI AUTUNNO VERNINI (FRUMENTO E ORZO)

---

**Fase fenologica:** post-raccolta

**Diserbo**

Per il diserbo delle stoppie da infestanti graminacee e dicotiledoni è possibile intervenire con:

- Acido pelargonico
- Glifosate
- Glifosate + 2,4-D (Max 1 applicazione tra post-emergenza e post-raccolta)

Per la sola coltura del **frumento**, per il contenimento di infestanti dicotiledoni:

- Pyraflufen-etile (impiego alternativo tra pre-semina, pre-emergenza e post-raccolta)

## MAIS

---

**Fase fenologica:** maturazione cerosa

**Piralide:** volo, ovideposizione e nascita larvale

Solo in caso di presenza accertata intervenire con Clorantraniliprole (Max 2), attivo anche nei confronti della **sesamia** e/o *Bacillus t.*

**Sesamia:** monitorare in campo la presenza del fitofago. In caso di presenza diffusa intervenire con Clorantraniliprole o **Lambdacialotrina (\*)** o Deltametrina o **Cipermetrina (\*)**

Max 1 tra tutti i piretroidi

## SOIA

---

**Fase fenologica:** formazione baccelli

### Tecniche Agronomiche

**Ragnetto rosso:** segnalate presenze in campo. Monitorare con attenzione (campione di 100 foglie/ha) e al superamento della soglia di 0,1-0,2 acari per foglia effettuare il lancio del predatore *Phytoseiulus persimilis* in misura di 0,5-1 esemplare per mq. Al superamento della soglia di 10 forme mobili per foglia (campione di 100 foglie/ha), è possibile intervenire con Exitiazox o Sali potassici di acidi grassi

## COLTURE ORTICOLE

In caso d'utilizzo delle schede Dose standard l'azienda è tenuta a registrare le motivazioni d'incremento o decremento.

Maggiori indicazioni per singola coltura in [Norme Tecniche di Coltura](#).

## ANGURIA (coltura semi forzata)

---

**Fase fenologica:** accrescimento- maturazione

### Difesa

**Peronospora:** in previsione di piogge intervenire preventivamente con Sali di rame o Cyazofamide (Max 3) o Amectotradina (Max 2) o Ametotradina + Fosfonato di K o Mandipropamide o **Fluopicolide(\*)** + Propamocarb (Max 1) o Propamocarb (Max 2) o Cimoxanil (Max 2) o Azoxystrobin o Pyraclostrobin o Zoxamide (Max 3) in associazione con Fosetil Al.

Tra Azoxystrobin, Trifloxystrobin e Pyraclostrobin Max 2 interventi all'anno  
Amectotradina e Propamocarb non ammessi in coltura protetta

**(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

**Oidio:** alla comparsa dei primi sintomi si consiglia di intervenire con Zolfo o Bicarbonato di potassio o Olio essenziale di arancio dolce o Azoxystrobin o Bupirimate (Max 2) o Ciflufenamid (Max 2) Ciflufenamid + **Difenoconazolo(\*)** o Fluxapyroxad + **Difenoconazolo(\*)**.

Tra Fluopyram e Fluxapyroxad Max 2 interventi.  
Difenoconazolo impiegabile solo in miscela con Ciflufenamid o Fluxapyroxad. Al massimo 1 intervento con **Difenoconazolo(\*)**

**(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

**Afidi:** si consigliano trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati o delle colonie iniziali, prima della comparsa di accartocciamenti fogliari, per poi affidare il contenimento degli attacchi alle popolazioni naturali di coccinellidi Interventi chimici ammessi con prodotti a base di Azadiractina, Piretrine pure, Sali potassici di acidi grassi o Maltodestrina o Flupyradifurone (Max 1), o Acetamiprid (Max 1) o Flonicamid (Max 2, non consecutivi). In data 5 marzo 2026 è stata concessa la deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego del prodotto fitosanitario EFFICON® 2026 contenente la s.a. dimpropyridaz per la difesa dagli afidi (*Aphis gossypii*) anguria in pieno campo - impiego consentito dal 1 marzo 2026 fino al 28 giugno 2026. o SULFOXAFLOR uso eccezionale dal 1° aprile al 29 luglio 2026 prodotto commerciale CLOSER

**Ragnetto rosso:** contro questa avversità sono consentiti massimo 2 interventi all'anno, ad esclusione di Sali potassici di acidi grassi, *Beauveria bassiana* e Maltodestrina.

In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con Sali potassici di acidi grassi o Maltodestrine o *Bauveria bassiana* o Exitiazox o Acequinocyl

## MELONE (coltura semiforzata)

**Fase fenologica :** accrescimento-maturazione

### Difesa

**Peronospora:** dopo la scopertura, in previsione di piogge, intervenire preventivamente con Sali di rame o Propamocarb (Max 2) o Cimoxanil (Max 2) o Ametotradina (Max 2) o Ametotradina + Fosfonato di K o Mandipropamide (Max 4) o Pyraclostrobin o Azoxystrobin o Zoxamide (Max 3) o Cyazofamide (Max 3) o Metalaxyl-m (Max 2) o **Fluopicolide(\*)**+ Propamocarb (Max 1).

Ametotradina Max 2 trattamenti – impiego ammesso solo in pieno campo.

Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin Max 2 trattamenti.

(\*) **Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

**Cancro gommoso:** intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto per limitare i danni di diffusione del patogeno con *Bacillus subtilis* o **Difenconazolo(\*)**+Ciflufenamid o **Difenconazolo (\*)**+Fluxapyroxad o Azoxystrobin(Max 2) o o Fluxapyroxad(Max 2)

Difenconazolo (Max 1)

**Oidio:** alla comparsa dei primi sintomi si consiglia di intervenire con Zolfo o Bicarbonato di potassio o Olio essenziale di arancio dolce o Bupirimate (Max 2) o **Difeconazolo(\*)** (Max 1) o **Tebuconazolo(\*)** (Max 1) o Tetraconazolo o Penconazolo o Trifloxystrobin o Azoxystrobin o Meptyldinocap (Max 1 – impiegabile entro il 30.09.2026) o Cyflufenamid (Max 2) o Metrafenone (Max 2) o Fluxapyroxad.

Tra Tebuconazolo, **Difenoconazolo**, Tetraconzolo, Penconazolo Max 3 interventi

**Difenoconazolo (\*)**(Max 1) solo in miscela con Fluxapyroxad o Ciflufenamid

Tra Tryfloxistrobin ed Azoxystrobin Max 2 trattamenti

Tra Fluxapyroxad e Fluopyram Max 2 trattamenti

Fluxapyroxad solo in miscela con **Difenoconazolo (\*)** e Max 2 con Fluopyram

(\*) **Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

**Afidi:** si consigliano trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati o delle colonie iniziali, prima della comparsa di accartocciamenti fogliari, per poi affidare il contenimento degli attacchi alle popolazioni naturali di coccinellidi. Interventi chimici ammessi con prodotti a base di Acetamiprid (Max 1), Flonicamid (Max 2, non consecutivi), o Tau-fluvalinate (Max1) o Piretrine pure

In data 16 marzo 2026 è stata concessa la deroga valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l'uso eccezionale del prodotto fitosanitario MOVENTO 48 SC 2026 contenente la s.a. spirotetramat per la difesa dagli afidi (*Aphis gossypii*) melone in pieno campo – impiego consentito dal 1° aprile 2026 fino al 29 luglio 2026. In data 5 marzo 2026 è stata concessa la deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego del prodotto fitosanitario EFFICON® 2026 contenente la s.a. dimpropyridaz per la difesa dagli afidi (*Aphis gossypii*) melone in pieno campo - impiego consentito dal 1 marzo 2026 fino al 28 giugno 2026. o SULFOXAFLOL uso eccezionale dal 1° aprile al 29 luglio 2026 prodotto commerciale CLOSER

Tra Piretrine e Piretroidi Max 1

**Ragnetto rosso:** contro questa avversità sono consentiti massimo 2 interventi all'anno, esclusi p.a. ammessi in agricoltura biologica.

In presenza di focolai con foglie decolorate intervenire, in concomitanza dei trattamenti aficidi, con Exitiazox o Acequinocil

## POMODORO DA INDUSTRIA

**Fase fenologica:** accrescimento- maturazione



Riscontrati danni a seguito dei forti temporali di ieri

## **Tecniche Agronomiche**

### **Difesa**

**Batteriosi:** segnalate presenze. In previsione di piogge intense ed eventi temporaleschi come quelli recentemente avvenuti, ove presenti sintomi o comunque con ibridi non tolleranti, intervenire con Sali di rame o *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* o COS-OGA.

Si ricorda che è stato concesso un uso eccezionale a IBISCO (COS-OGA) dal 20 aprile al 17 agosto 2026, specificatamente contro le batteriosi (*Pseudomonas* spp., *Xanthomonas* spp.).

**Peronospora:** al momento assenza della malattia. In previsione di pioggia, intervenire con prodotti di copertura come Rame o Folpet da soli o in miscela con prodotti endoterapici quali Metalaxil-M (max 3) Propamocarb (solo in miscela con Cimoxanil), Oxathiapiprolin (max 3), Fosetil Al (impiegabile fino ad allegagione secondo palco).

È possibile iniziare il ciclo di interventi con il formulato induttore di resistenza ad azione sistemica e preventiva (prodotto fitosanitario ROMEO s.a. Cerevisane, uso eccezionale dal 20 aprile 2026 al 17 agosto 2026).

Tra Folpet, Fluazinam e Captano max 4

**Alternariosi:** possibili condizioni predisponenti lo sviluppo della malattia causate dalla senescenza delle foglie basali quando accompagnate da piogge o bagnature prolungate. Normalmente la conduzioni di corrette pratiche agronomiche quali rotazioni, scelta di piante disinfettate l'evitare ristagni e una razionale irrigazione oltre all'efficacia degli interventi indirizzati al controllo della peronospora che risultano efficaci anche per il controllo di alternariosi sono sufficienti al controllo della malattia.

In caso di gravi attacchi in zone particolarmente umide intervenire alla comparsa dei primi sintomi con *Bacillus subtilis*, *Bacillus Amyloliquefacens* o prodotti Rameici o Pyraclostrobin o Azoxystrobin (Max 2) o Zoxamide (Max 4) o Fluxapiraxad (Max 2) o **Difenconazolo(\*)** (Max 2) o Ciflufenamid o Captano o Folpet

Tra Captano e Folpet Max 4

Cyflufenamid solo in miscela con Difenconazolo

Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin Max 3

Pyraclostrobin e Zoxamide non ammessi contro Septoriosi

**Nottua gialla:** proseguono le catture di adulti nelle trappole di monitoraggio a feromone, con variabilità nelle diverse zone. Si sono osservati sporadici danni (fori nei frutti) e larve sulla vegetazione. Proseguire il monitoraggio controllare le trappole per verificare la presenza dell'insetto. Si ricorda che la soglia di intervento corrisponde a 2 piante con presenza di uova o larve su 30 piante controllate per appezzamento. Verificare la presenza di infestazione e il superamento della soglia intervenire con Clorantpriliprole (Max 2) o Spinosad (Max 3) o **Emamectina(\*)** (Max 2) o *Bacillus thuringiensis*.

**(\*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione**

Tra Spinosad e Spinetoram al Max 3 interventi

Tra Piretrine e Piretroidi Max 3 interventi

**Ragnetto:** si rilevano sporadici sintomi dovuti ad infestazioni in fase iniziale lungo i bordi degli appezzamenti. L'aumento delle temperature e l'assenza di piogge favoriscono lo sviluppo delle infestazioni; effettuare il monitoraggio nelle zone storicamente infestate, soprattutto nelle aree perimetrali degli appezzamenti vicino a strade polverose. Valutare, in caso di presenza accertata di focolai precoci di infestazione, in accordo al tecnico OP, se intervenire in questa fase in presenza accertata di focolai precoci con evidenti aree decolorate delle foglie con prodotti a base di Acequinocyl o Exitiazox o Fenpiroximate (Max 1) o Ciflumetofen o Milbemectina (Max 2) o Sali potassici degli acidi grassi o Olio minerale o Maltodestrina o Zolfo o Olio essenziale di arancio dolce o *Beauveria bassiana*; in alternativa, valutare la possibilità di utilizzare ausiliari come il predatore *Phytoseiulus persimilis*.

**Tripidi:** presenza sporadica. Oltre a causare aree con depigmentazione/argentatura sulle foglie, possono causare anche aborti fiorali e deformazioni dei tessuti. Tali insetti possono trasmettere virus come il Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). In caso di sintomi sospetti, contattate i tecnici per la verifica della presenza del fitofago e la valutazione di un eventuale intervento. Lo Spinosad impiegato per la difesa della nottua gialla è attivo nei confronti dei tripidi.

In alternativa impiegare Azadiractina o Olio essenziale di arancio dolce o Sali potassici degli acidi grassi o *Beauveria Bassiana*. Si consiglia di aggiungere alla miscela un bagnante/adesivante e di bagnare bene la vegetazione.



## BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA

### INFORMAZIONI GENERALI E NORMATIVE

Le modifiche rispetto al bollettino precedente sono evidenziate in giallo (parti eliminate) e in verde (parti aggiunte/news)

#### AMBITO APPLICATIVO

Le seguenti indicazioni tecniche fanno riferimento a quanto previsto dal Regolamento della Unione europea sulla produzione biologica n. 2018/848 e dai relativi numerosi Regolamenti esecutivi ed integrativi entrati in vigore dal 1<sup>a</sup> gennaio 2022 con disposizioni direttamente applicabili da parte dei cittadini.

Ulteriori disposizioni applicative sono contenute all'interno del Decreto Ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Le indicazioni di seguito riportate **hanno quindi valenza** per le aziende inserite nei programmi relativi a:

- Applicazione dei Regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica Reg. (UE) n. 2018/848 (che ha riformato e abrogato il Reg. (UE) 834/2007 e il Reg. (UE) 889/2008;

- Reg. EU n. 1305/2013 Tipo di Operazione 10.1.01 e il n. 2220 del 23 dicembre 2020 (Regolamento di transizione 2021-2022);
- Reg. EU n. 2021/2115 SRA 29 (CoPSR 2023-2027).

## INDICAZIONI LEGISLATIVE

### NEWS BANDI

La data per la protocollazione delle domande di pagamento è scaduta lo scorso 30 giugno 2026. Alle domande di pagamento a saldo presentate entro i 25 giorni successivi a tale data, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo al 30 giugno. Le domande di pagamento, presentate oltre il 25 luglio dalla scadenza del termine previsto, non potranno essere accolte e saranno rigettate.

### **DICHIARAZIONE DELLE COLTURE**

Si ricorda che dal 14/4/2025 il PAP è stato abrogato e di conseguenza la compilazione sul sito del SIAN è inibita.

Permane l'obbligo per gli operatori di includere le loro previsioni di produzione pianificate nelle dichiarazioni o comunicazioni effettuate all'ODC ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 (relazione tecnica), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 148 del 30 ottobre 2023.

**È previsto che le informazioni sulle colture effettuate e relative rese, siano dichiarate nei Piani colturali grafici annuali.**

Per le modalità di comunicazione delle informazioni sopra richiamate si consiglia in ogni caso di seguire le indicazioni degli ODC.

### **NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE - ABBRUCIAMENTO di residui vegetali**

In base a quanto stabilito dal PAIR 2030 e al DM 69/2023 e s.m.i. in merito alle prescrizioni legate al superamento dei limiti di PM10 dell'anno scorso, nei comuni della **Pianura Ovest** **vige il divieto di abbruciamento per i mesi di luglio e agosto.**

Dal 22 giugno al 14 settembre, l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile rende attiva, su tutto il territorio regionale, la **fase di attenzione per gli incendi boschivi nella stagione estiva.**

Al momento è stato emesso un bollettino di **rischio medio (codice giallo)**, valido fino al **19 luglio** su tutto il territorio regionale, con esclusione delle zone montane: si raccomanda alla cittadinanza di gestire con la **massima cautela gli abbruciamenti di residui vegetali** dei lavori agricoli e forestali, che potranno essere effettuati solo in assenza di vento e unicamente in mattinata. **I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11 del mattino.**

La quantità giornaliera ammessa all'abbruciamento dovrà comunque non essere superiore a tre metri steri per ettaro.

Tra le principali novità introdotte dal recente aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi c'è la nuova suddivisione per **aree omogenee di rischio**, che supera la tradizionale ripartizione per province, con l'obiettivo di fornire degli avvisi più puntuali e consentire una gestione

più efficace degli interventi e delle emergenze. Le nuove zone sono consultabili al seguente link: [Bollettini incendi boschivi - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile](#).

Per consultare i bollettini visita la [pagina dedicata](#).

Per verificare le modalità di abbruciamenti fare riferimento alla [DGR n.1142/2024](#). Per la comunicazione di un abbruciamento controllato destinata ai Vigili del Fuoco, al Comune, ai Carabinieri Forestali viene messa a disposizione una **WebApp di semplice attivazione**: [WebApp di attivazione](#).

**È possibile effettuare, in deroga, abbruciamenti di residui vegetali infetti da *Erwinia amylovora*.**

Con determinazione dirigenziale n° 2575 del 15/02/2021 il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" e in particolare:

1. raccomanda l'asportazione delle parti vegetali colpite da *Erwinia amylovora* dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;

2. dispone l'**obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli**;

3. raccomanda che tali abbruciamenti

- avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
- siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
- verificare la presenza di eventuali divieti imposti a livello regionale per il rischio di incendi.

Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti **previa trasmissione di una comunicazione**, debitamente compilata e firmata, all'indirizzo mail del Servizio Fitosanitario ([omp1@regione.emilia-romagna.it](mailto:omp1@regione.emilia-romagna.it)).

Tutte le informazioni relative alle norme in materia di abbruciamenti e qualità dell'aria sono disponibili pagina web dedicata ([Abbruciamenti di residui vegetali - Aria - Ambiente](#))

## INFORMAZIONI METEO

Ai seguenti link sono disponibili informazioni riguardo le previsioni meteorologiche ed i dati rilevati oltre che i bollettini agrometeorologici e agrofienologici:

- [Previsioni Arpae Meteo Emilia-Romagna](#)
- [Dati in tempo reale \(da sito ARPAE\)](#)
- [Mappe agrometeo \(da sito ARPAE\)](#)
- [Bollettini agrometeo \(da sito ARPAE\)](#)
- [Bollettino agrofienologico \(da sito DISTAL – UNIBO\)](#)

NOTA: si segnala il seguente link per il monitoraggio degli eventi calamitosi avversi, anche di carattere temporalesco o grandinigeno: [Link Allerta Meteo Emilia Romagna](#).

**TECNICHE AGRONOMICHE****SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA**

In agricoltura biologica si possono utilizzare solamente sementi e materiale di moltiplicazione certificati provenienti da agricoltura biologica. Considerata l'insufficiente disponibilità da parte del mercato di tale materiale per talune varietà, qualora non sia possibile reperire semente o materiale di pre-moltiplicazione biologico è consentito utilizzare materiale non biologico proveniente da agricoltura convenzionale, richiedendo la deroga secondo apposita procedura.

Per la verifica di disponibilità di semente biologica occorre fare riferimento al sistema informativo chiamato [Banca Dati Sementi Biologica \(sian.it\)](http://Banca Dati Sementi Biologica (sian.it)).

**Nel caso si necessiti della deroga per la semina di semente convenzionale, occorre accedere all'applicativo del sistema di concessione della deroga presente sul sito [SIAN](http://SIAN).**

L'utilizzo della nuova BDSB è subordinato alla registrazione come utente qualificato: [Iscrizione Utente Qualificato \(sian.it\)](http://Iscrizione Utente Qualificato (sian.it)).

Le regole di funzionamento della Banca Dati Sementi Biologica sono stabilite nel DM 24 febbraio 2017.

L'autorizzazione all'utilizzazione di semente o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, viene concessa dall'applicativo informatico della Banca Dati Sementi, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo rispettino i seguenti vincoli:

- a) il materiale riproduttivo vegetale non biologico non è trattato con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2018/848 elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2021/1165 (ex allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008), a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato non abbia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale;
- b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- c) soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

**“PRENOTAZIONE” PER LE SEMENTI IN LISTA ROSSA**

Si ricorda che con la circolare n. 613313 del 6/11/2023 è stata data indicazione della **disattivazione del controllo bloccante** per la richiesta di deroga per le varietà delle specie inserite nella “lista rossa”.

**STRUTTURAZIONE BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE:**

Le specie o alcune categorie commerciali di una specie di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuto con il metodo di produzione biologico, sono distinte all'interno della BDS in tre liste di appartenenza:

- a) **lista rossa**: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantità sufficienti sul mercato nazionale come biologiche/in conversione, **per le quali NON è concessa deroga, salvo casi eccezionali** (manifestazione di interesse). Ad oggi in lista rossa ci sono “**frumento duro**”, “**frumento tenero**”, “**orzo**”, “**avena comune e bizantina**”, “**farro dicocco**”, “**farro monococco**”, “**erba medica**” e “**trifoglio alessandrino**”. Ad oggi la funzione

“manifestazione di interesse” è disabilitata, quindi per richiedere deroga è necessario accedere alla BDSB e verificare la non presenza di materiale biologico per la specie e varietà richiesta.

b) **lista verde:** elenca le specie o le categorie commerciali di una specie non disponibili come biologiche/in conversione sul mercato nazionale e per le quali, ai sensi del punto 1.8.5.7 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, **è concessa annualmente una deroga generale.**

c) **lista gialla:** contiene l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese nella lista rossa o verde, per le quali è necessario, **tramite la BDSB con accesso in area riservata, effettuare una verifica di disponibilità commerciale ed in presenza di disponibilità sarà necessario effettuare preventivamente una richiesta di interesse verso tutte le aziende fornitrici. Solo dopo aver ricevuto una risposta da tutte le aziende fornitrici o, in alternativa, dopo che siano trascorsi i termini previsti del decreto per la possibile risposta ad una richiesta di interesse (5 giorni lavorativi), sarà possibile richiedere il rilascio della deroga in BDSB.**

Nel caso in cui la specie/varietà sia richiesta per scopi di ricerca e sperimentazione o conservazione la BDS consente all'operatore di ottenere il rilascio della deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici nei casi previsti.

La BDS contemporaneamente al rilascio di deroga, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di Controllo dell'operatore al fine di assicurare la successiva azione di verifica e controllo.

Qualora una determinata varietà non fosse presente in BDSB occorre chiederne l'inserimento (precisando specie, denominazione e status della varietà – per esempio se iscritta al catalogo comune comunitario) a CREA-DC per la necessaria istruttoria al seguente indirizzo e-mail: [deroghe.bio@crea.gov.it](mailto:deroghe.bio@crea.gov.it).

Il Reg. UE 2018/848 ha introdotto la possibilità di utilizzare il **materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico**; cioè un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che presenta caratteristiche fenotipiche comuni ed ha altre caratteristiche. Questo materiale può essere commercializzato senza rispettare i requisiti di registrazione e senza rispettare le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie, stabiliti nelle direttive sementiere.

Le caratteristiche e le modalità di riconoscimento di questo materiale eterogeneo sono definite nel Reg. (UE) n. 2021/1189 (Reg. esecutivo del Reg. 2018/848) della Commissione.

## ROTAZIONI

In agricoltura biologica le rotazioni hanno un ruolo fondamentale poiché svolgono allo stesso tempo la funzione di migliorare la fertilità (fisica, chimica e biologica) del suolo, di limitare le erbe infestanti e di abbassare l'inoculo di patogeni. La mono successione porta, in tempi più o meno rapidi, alla manifestazione di diversi fenomeni degenerativi riconosciuti come stanchezza del terreno. La stanchezza del terreno è associata ad anomalie metaboliche della sostanza organica che portano alla produzione di tossine e rendono difficile la coltivazione di una specie in successione con sé stessa. Devono essere effettuate quindi ampie rotazioni che prevedano il susseguirsi di colture miglioratrici dopo colture che impoveriscono il suolo ed in linea generale è bene privilegiare specie dotate di caratteristiche antitetiche, gestite con pratiche agronomiche diverse (sarchiate/non sarchiate), coltivate in periodi dell'anno differente e con problemi parassitari diversi. Importante è l'inserimento nella rotazione di sovesci per il ruolo fertilizzante e migliorativo della struttura del terreno (graminacee, leguminose, crucifere) e per l'attività biocidi nei confronti di patogeni e parassiti (crucifere).



Il nuovo Decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771 recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici” stabilisce le regole per la rotazione in agricoltura biologica.

Il Decreto riporta le norme tecniche per la gestione delle rotazioni in agricoltura biologica; si riporta di seguito una versione integrata:

1) Il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture.

2) In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. In caso di colture in ambiente protetto si applica quanto previsto dall'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 lettera b) del Regolamento “La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale”.

3) In deroga alla regola dell'avvicendamento con almeno due cicli di colture principali:

**a.** Un cereale autunno-vernino può succedere a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;

**b.** il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;

**c.** gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;

**d.** le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

4) In tutti i casi di cui ai punti 2 e 3, **la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.**

5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

6) I vincoli di rotazione non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.

## FERTILIZZAZIONE

### NORME PER LA FERTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

La fertilizzazione in agricoltura biologica è volta principalmente a mantenere e potenziare la fertilità e l'attività biologica del suolo. Per far ciò è necessario salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, che funge anche da riserva di elementi nutritivi per le piante, attraverso pratiche colturali che contribuiscano ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.

Questi obiettivi sono raggiunti:

- a) mediante l'uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio (per tutte le colture, tranne nel caso di pascoli o prati permanenti);
- b) mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale (nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi);
- c) mediante la fertilizzazione con effluenti di allevamento o con altre matrici ricche di sostanza organica, preferibilmente compostate, di produzione biologica (per tutte le colture).

Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure sopradescritte, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 (Reg. (UE) 2018/848 CAPO III Norme di Produzione) per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti.

Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali. (Allegato II" – Reg. 1165/2021 - [vedi link](#)).

**Per l'utilizzo di ammendanti organici** (letame maturo e compost), non vengono fissati vincoli specifici relativi all'epoca della loro distribuzione e al frazionamento. Occorre tuttavia rispettare le norme igienico sanitarie e quelle di settore (Direttiva 91/676/CEE cd. Direttiva Nitrati e Reg. Regionale 2/2024). Si ricorda che per gli ammendanti si considera un'efficienza dell'Azoto pari al 40%.

**Per gli effluenti zootecnici** non palabili e palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio si deve considerare la diversa efficienza in base alla tipologia di effluente, all'epoca e modalità di distribuzione.

Per determinare la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, è possibile prendere in considerazione quanto riportato nei [Norme generali - 2026 - Agricoltura, caccia e pesca](#) (Allegato II Tab da 7 a 8c).

**La quantità totale di effluenti di allevamento (come definiti nella direttiva 91/676/CEE e Regolamento Regionale n. 2/2024) impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg/ha/anno di azoto inteso come quantitativo medio aziendale annuo.**

Si specifica che con la Circolare Ministeriale n. 92711 del 26/2/2024 il Ministero chiarisce che, salvo requisiti più restrittivi posti dalle normative unionali, nazionali e regionali pertinenti, nel calcolo dei 170 kg/ha anno sono da conteggiare i prodotti ottenuti dai materiali quali miscele di concimi organici azotati, le 'miscele di concimi organici NP' e il 'separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini' per la sola quota derivante da effluenti, mentre non è da conteggiare l'azoto proveniente da digestato.

Tale Circolare non si applica in Emilia-Romagna in quanto, **in base al Reg. regionale 2/2024 il digestato concorre, per la sola quota derivante da effluenti, al calcolo della soglia di 170 kg/ha anno, anche ai fini del rispetto del corrispondente impegno per l'agricoltura biologica.**

Gli agricoltori biologici possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti da allevamenti biologici.

Non è ammesso l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento (letame anche in prodotti composti; letame essiccato e pollina; effluenti di allevamento compostati pollina e stallatico compostato; effluenti liquidi) provenienti da allevamenti industriali. Si intende per allevamento industriale un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- Gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- Gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

Deiezioni ed effluenti potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.

È consentito l'uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparati adeguati a base di vegetali e di microrganismi.

Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.

È consentito l'uso di preparati biodinamici.

**Tutti gli impieghi dei fertilizzanti devono essere registrati nelle schede di registrazione delle operazioni colturali che devono essere conservate.**

Si ricorda che il rame ad uso nutrizionale e altri impieghi simili deve essere comunque conteggiato come impiego all'interno del quantitativo massimo definito per la difesa fitosanitaria (Circolare MIPAAF dell'11/6/2021 Prot. Uscita N.0269617 del 11/06/2021 [vedi link](#)).

Nella scelta dei fertilizzanti commerciali verificare che sul prodotto ci sia l'indicazione "Consentito in agricoltura biologica". Si ricorda che è possibile anche la consultazione dei fertilizzanti ammessi all'uso in biologico all'interno del [Registro Fertilizzanti \(sian.it\)](#).

**RACCOMANDAZIONI PER LA FERTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Tenendo conto che l'obiettivo prioritario della fertilizzazione è il mantenimento della fertilità del suolo, i quantitativi di macroelementi da apportare possono essere calcolati in funzione di un bilancio tra:

- asportazioni di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O in base alle rese medie della coltura;
- disponibilità di nutrienti e degli ulteriori parametri della fertilità, individuati per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico (in base ad apposite analisi chimico-fisiche del terreno ovvero ad informazioni cartografiche).

Le quantità di elementi nutritivi che le colture possono utilizzare dipendono dalla mobilitazione delle riserve contenute nella sostanza organica e dall'attività biologica. Tali fenomeni sono determinati dalle caratteristiche costituzionali (tessitura, capacità di scambio, ecc.), dall'andamento idrologico e termico del suolo e dell'atmosfera, ma soprattutto dalle pratiche agronomiche,

Si sottolinea ad esempio come, tra le lavorazioni del terreno, quelle che rivoltano gli strati o sminuzzano maggiormente le particelle di terreno hanno un maggior impatto sull'attività biologica e favoriscono la mineralizzazione della sostanza organica, riducendone la riserva.

Per il calcolo del bilancio, è possibile utilizzare il metodo del bilancio previsionale valido per il sistema di produzione integrato, adottando le indicazioni e gli algoritmi riportati nelle [Norme generali - 2026](#) (Allegato II) oppure avvalendosi del software per la formulazione del piano di fertilizzazione scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna ([Norme generali - 2026 - Agricoltura, caccia e pesca](#)).

Nel caso in cui per la fertilizzazione delle cover crops si siano utilizzati effluenti zootecnici o del digestato, il relativo effetto fertilizzante andrà conteggiato nel bilancio generale a favore della coltura che segue la cover crop.

## IRRIGAZIONE

**Alcune indicazioni tecniche non vincolanti** relative alla irrigazione sono riportate al Capitolo 12 delle Norme generali dei disciplinari di produzione integrata e nelle singole schede di coltura.

È inoltre disponibile l'applicativo Fertirrinet per la gestione della fertirrigazione per le colture di mais, pomodoro, patata e pero.

Il servizio è presente in IrriNet e fornisce un consiglio di fertilizzazione e permette anche la registrazione anch'essa a norma delle operazioni eseguite. L'applicazione tiene conto del tipo di coltura, fase fenologica, tipo di suolo, condizioni meteo rilevate e previste, oltre che delle irrigazioni e fertilizzazioni eseguite (incluse le eventuali fertilizzazioni ordinarie), nonché coltura precedente. Al servizio si accede, per i nuovi utenti, previa registrazione attraverso il link: [IrriNet Emilia Romagna](https://www.rrnet.it).

Per chi è già utente IrriNet è sufficiente inserire i seguenti input richiesti per ottenere il calcolo: "Dati chimici del suolo" e "Dati della coltura per la fertirrigazione".

**Laddove si verifichino precipitazioni maggiori ai 30 mm tra il 15 e il 19 luglio, si consiglia di sospendere le irrigazioni.**

Di seguito si elencano le perdite per evapotraspirazione per ciascuna coltura:

- Fragola Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 3,5 mm
- Melone Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 4 mm
- Cocomero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 4mm
- Aglio Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3
- Cipolla Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3
- Patata Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,5
- Pomodoro da industria Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3.5
- Bietola da zucchero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Bietola da seme Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Mais Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Erba medica Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Prato stabile Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Fagiolino Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3

**Arboree**

| COLTURA          | INTERFILARE<br>INERBITO | INTERFILARE<br>LAVORATO | NOTE |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| POMACEE          | 5                       | 4,5                     |      |
| ALBICOCCO-SUSINO | 4,5                     | 3,5                     |      |
| CILIEGIO         | 4,5                     | 3,5                     |      |
| PESCO            | 3,5                     | 2,5                     |      |
| VITE             | 3,5                     | 3                       |      |
| ACTINIDIA        | 4                       | 3,5                     |      |

**Nei vigneti e negli arboreti** è possibile effettuare un intervento di soccorso negli impianti giovani.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 45 mm su susino con interfilare inerbito determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (45/4,5)

La fertirrigazione degli impianti arborei a partire già dall'anno di impianto è necessaria per favorire l'ottimale sviluppo della pianta, in particolar modo dell'apparato radicale. Si invitano pertanto tecnici e agricoltori a preparare adeguatamente gli impianti fertirrigui fin da ora, effettuando le dovute manutenzioni.

Si invitano tecnici e agricoltori a rilevare o stimare l'acqua disponibile nel terreno. Ove non sia sufficiente è possibile irrigare tutte le colture, anche, ovviamente, le colture protette. Per calcolare i volumi corretti di acqua da distribuire si suggerisce l'uso di sistemi di supporto decisionale, come, per esempio, Irrinet.

Per approfondire le modalità di calcolo dell'acqua disponibile, per toccare con mano sensori e centraline meteo, per vedere in azione gli impianti irrigui più innovativi o semplicemente per fare domande sulla propria situazione irrigua aziendale, l'Area dimostrativa delle tecnologie irrigue di Acqua Campus sarà aperta su prenotazione dal 31 marzo 2026, contattando Gioele Chiari al 3497504961. L'area è stata implementata di nuove tecnologie grazie anche al GOI Regionale Acqua Smart, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

**DATI DI FALDA**

I dati di profondità della falda ipodermica nei suoli della pianura dell'Emilia-Romagna sono consultabili presso la pagina [FaldaNet-ER](#) del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo CER.

**DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI**
**INFORMAZIONI GENERALI**
**PATENTINI FITOSANITARI**

Dal primo settembre 2022 i rilasci e i rinnovi dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentini fitosanitari) sono dematerializzati e il codice QR sostituisce il patentino cartaceo. Per maggiori informazioni consultare il link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/difesa-sostenibile/uso-sostenibile/patentino/il-nuovo-patentino-fitosanitario-dematerializzato>

## **TRATTAMENTI IN FIORITURA**

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale del 04 marzo 2019 n. 2, inerente "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna", le prescrizioni per i trattamenti in fioritura sono come di seguito riportate:

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

Per consultare l'intera normativa BURERT n 64 del 04 marzo 2018.

### **Reti di copertura**

Si ricorda che la messa in opera delle reti antigrandine o delle reti antinsetto durante la fioritura delle piante arboree provoca danni alle api perché vengono intrappolate dalle reti stesse ma anche perché vengono disorientate dalle modificazioni ambientali. Effettuare queste operazioni dopo la fioritura.

## **APPROFONDIMENTI (MITIGAZIONE DELLA DERIVA, MACCHINE IRRORATRICI E AGRICOLTURA BIOLOGICA)**

Si segnala che al seguente link sono reperibili alcuni approfondimenti tecnici riguardanti le macchine irroratrici, l'agricoltura biologica e la mitigazione della deriva:

[Approfondimenti - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#)

## **CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE DELLE IRRORATRICI**

Il controllo e la regolazione delle irroratrici devono essere eseguiti presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1862/2016.

Le aziende agricole in produzione biologica che applicano la Misura 11 del PSR 2014-20 e la Misura 214 – Azione 2 del PSR 2007-13, devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei



fitofarmaci, al controllo funzionale ed alla regolazione strumentale volontaria (“regolazione strumentale”), come definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

**Per le aziende che aderiscono allo SRA29 a partire dal 1/1/2023 l’obbligo della regolazione delle irroratrici non è più in vigore;** nonostante questa indicazione la regolazione delle irroratrici è fortemente consigliata. **L’obbligo della regolazione permane per le aziende aderenti alla SRA19 – Azione 1.**

**Nota:** sulla base di disposizioni assunte a livello regionale, si segnala che il collaudo dell’irroratrice dopo scadenza dell’attestato di conformità può essere rimandato a condizione che le previste operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale risultino attuate prima di qualsiasi trattamento eseguito successivamente alla scadenza dell’attestato stesso.

Ne deriva che **nessun trattamento fitosanitario può essere eseguito con attestato di conformità scaduto.**

## **REVISIONE EUROPEA DEL RAME**

A seguito all’entrata in vigore del Reg UE 2025/1489 l’autorizzazione all’immissione in commercio della sostanza attiva è prorogata al 31 giugno 2029.

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-climatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all’anno”. A questo fine si ricorda che tutti gli impieghi di rame (inclusi quelli contenuti nei fertilizzanti e altri prodotti simili) devono essere conteggiati come previsto dalla Circolare MIPAAF dell’11/6/2021 Prot. Uscita N.0269617 del 11/06/2021.

## **SOSTANZE CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE DELLE PIANTE**

La lista dei formulati commerciali di sostanze corroboranti-potenziatori delle difese delle piante approvati dalla Commissione tecnico-consultiva corroboranti del MASAF per l’impiego in agricoltura, sono consultabili nella sezione della banca dati prodotti fitosanitari del SIAN al link <https://www.sian.it/mimfFitoPub/home.get>.

Il DM 0242742 del 30 maggio 2024 prevede l’obbligo di indicare in etichetta del prodotto per quale metodo di agricoltura ne sia possibile l’impiego: PUO’ ESSERE IMPIEGATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA; NON PUO’ ESSERE IMPIEGATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.

## **LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO FLAVESCENTZA DORATA**

Il Settore fitosanitario e difesa delle produzioni ha stabilito le misure di lotta obbligatoria da attuare in Emilia-Romagna per contenere la diffusione della Flavescenza dorata della vite. Le misure di lotta sono contenute nella Determinazione n. 9818 del 20/05/2026 disponibile al link [Prescrizioni per la lotta contro Flavescenza dorata della vite - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#)

Gli interventi obbligatori riguardano:

- l'estirpo di ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, (senza necessità di analisi), nelle aree vitate presenti nelle aree definite come **zona infestata** e di quelle sintomatiche presenti nelle aree vitate delle **zone cuscinetto** e del restante territorio in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata (confermate da analisi di laboratorio)
- I trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* con che dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dalla sopra richiamata Determinazione a partire dal 3 giugno 2026 e comunque non prima della completa sfioritura della vite e dopo avere sfalciato le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura; nei vigneti a conduzione integrata (2 trattamenti obbligatori) il primo trattamento dovrà essere realizzato entro il 18 giugno e il secondo entro e non oltre il 31 luglio 2026; nei vigneti a conduzione biologica e nei vigneti a conduzione integrata in cui vengono impiegate sostanze attive ammesse in biologico (3 trattamenti obbligatori) il primo trattamento dovrà essere realizzato entro il 15 giugno, il secondo entro il 30 giugno e il terzo entro e non oltre il 15 luglio 2026; nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai il terzo trattamento dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31 agosto 2026. Si precisa che nel caso di utilizzo di sostanze attive ammesse in biologico si dovrà seguire quanto indicato per le aziende viticole.

I momenti precisi e i consigli tecnici per effettuare gli interventi sono riportati nella "parte specifica" – vite

## PARTE SPECIFICA

### **BOLLETTINI MODELLI PREVISIONALI MONITORAGGI AEREOBIOLOGICI**

Sono disponibili alle seguenti pagine i report redatti periodicamente per i fitofagi e le malattie fungine e batteriche.

- [Fitofagi](#)
- [Malattie fungine e batteriche](#)

### **INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CIMICE ASIATICA (HALYOMORPHA HALYS)**

Utilizzando il seguente link è possibile visualizzare i dati delle catture di cimice asiatica nelle trappole di monitoraggio presenti in Emilia-Romagna: [BIG: Monitoraggio Halyomorpha halys in Emilia-Romagna \(unibo.it\)](https://www.unibo.it/it/ricerca/monitoraggio-halyomorpha-halys-in-emilia-romagna)

### **CIMICE ASIATICA:**

#### **Settimana 6 luglio – 12 luglio 2026**

Dopo diverse settimane di calo, le catture di adulti risultano nuovamente in aumento. Pur mantenendosi ancora inferiori al primo picco stagionale registrato nel mese di maggio, confermano il progressivo incremento della presenza degli adulti di prima generazione. La comparsa degli adulti di nuova generazione risulta anticipata rispetto alla media storica e in linea con quanto osservato nel 2025. Le catture delle forme giovanili si mantengono sostanzialmente in linea con la settimana precedente. Le neanidi hanno probabilmente superato il primo picco stagionale e non si osserva

ancora un chiaro incremento delle nuove neanidi derivanti dalle uova di seconda generazione. I monitoraggi attivi confermano nel complesso una presenza contenuta sul territorio. Le segnalazioni di danni rimangono limitate sulle drupacee in raccolta e generalmente circoscritte alle situazioni caratterizzate da fattori predisponenti alla presenza della cimice.

### **Previsioni e consigli per la settimana dal 13 al 19 luglio**

Le simulazioni del modello HHAL-S prevedono un ulteriore incremento della presenza di adulti di prima generazione e un deciso aumento della deposizione delle uova di seconda generazione. Le forme giovanili dovrebbero mantenersi inizialmente su livelli stabili, con un progressivo incremento atteso dalla fine del periodo per effetto della comparsa delle prime neanidi di seconda generazione. Pur in presenza di una situazione che al momento appare generalmente buona, si raccomanda di proseguire con attenzione i monitoraggi aziendali per intercettare tempestivamente eventuali spostamenti di adulti provenienti da colture in raccolta o da aree non gestite. Su però la situazione risulta nel complesso sotto controllo, ma la prolungata suscettibilità della coltura rende opportuno mantenere elevata l'attenzione, in particolare negli impianti più vigorosi e con vegetazione fitta, nelle aree caratterizzate da popolazioni storicamente elevate o in prossimità di siepi, boschetti e altri elementi favorevoli alla presenza della cimice.

## **MONITORAGGIO DELLE CAVALLETTTE**

Con i sopralluoghi effettuati in questi giorni sono state rilevate le prime neanidi della cavalletta dei prati, nota altresì come Cavalletta italiana (*Calliptamus italicus*) nei campi sentinella delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, aree già interessate da infestazioni negli anni precedenti.

Con questi primi ritrovamenti si apre la fase di massima attenzione per l'individuazione dei focolai iniziali e la realizzazione di interventi localizzati. Si raccomanda di concentrare le attività di monitoraggio nei terreni che negli anni scorsi hanno registrato elevate infestazioni.

Si ricorda che la strategia della Regione Emilia-Romagna per la lotta e il contenimento delle cavallette è basata sulla prevenzione e punta all'individuazione dei luoghi di nascita (le cosiddette "grillare") su cui devono essere realizzati interventi insetticidi mirati da effettuare quando le cavallette sono ancora piccole, prive di ali e concentrate su piccole superfici. Questi interventi preventivi, realizzati con insetticidi biologici (ad es. Spinosad o piretro naturale) fra metà maggio e la fine di giugno, evitano una successiva dispersione delle cavallette sul territorio, limitando i danni alle coltivazioni. A tal fine si segnala che, con Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2026, è stato autorizzato l'uso in emergenza del formulato LASER 120 SC (Spinosad) su erba medica, trifoglio e leguminose foraggere, contro la cavalletta crociata (*Dociostaurus maroccanus*) e la cavalletta italiana (*Calliptamus italicus*), per un periodo di 120 giorni (7 maggio – 3 settembre 2026). Tale formulato è impiegabile anche per le aziende che seguono i disciplinari di produzione integrata della regione Emilia-Romagna.

## **COLTURE ARBOREE**

### **TECNICHE AGRONOMICHE**

La coltivazione biologica deve utilizzare prevalentemente nutrienti che contengano i tre principali elementi della fertilità: azoto, fosforo e potassio oltre ad una serie di altri meso e micro elementi.

L'esigenza di apportare azoto determina la quantità di concimi organici che è necessario distribuire le quantità di fosforo e di potassio sono conseguenti alle quantità distribuite per apportare azoto. Solo nel caso si debbano apportare quantità di fosforo e di potassio aggiuntive, queste possono essere distribuite attraverso fertilizzanti fosfatici e potassici di origine naturale.

È buona regola anticipare gli apporti di sostanza organica, P e K, per quanto possibile nella fase di pre-impianto in occasione delle lavorazioni principali. Una quota di concimi organici deve essere distribuita dopo il trapianto per garantire l'apporto di nutrienti durante tutto il ciclo. In questo caso è preferibile l'apporto tramite fertirrigazione.

Il calcolo delle esigenze dovrebbe essere basato sull'esecuzione di un bilancio che considera diverse voci fra cui la dotazione del terreno evidenziata tramite analisi, l'impiego di sovesci/ cover crops e le presumibili asportazioni legate ai livelli produttivi.

Si consiglia di preferire l'interramento dei residui delle coltivazioni di graminacee rispetto all'asportazione.

## Difesa arborea

## MELO

---

### Fase fenologica: accrescimento frutti

**Colpo di fuoco batterico:** in presenza di forti temporali e/o eventi grandinigeni si consiglia di intervenire entro le 24 ore con Prodotti rameici; attenzione alla fitotossicità del rame: sconsigliato l'impiego sulle varietà del gruppo Pink lady e Fuji, trattare a pianta asciutta e distanziare da eventuali applicazioni di concimi fogliari.

Intervenire asportando tutti gli organi colpiti tagliando ad almeno 70 cm al di sotto del punto d'ingresso del batterio per arrestarne la diffusione lungo i vasi legnosi e provvedere alla disinfezione degli attrezzi utilizzati.

**Ticchiolatura:** si raccomanda di verificare con attenzione in campo la presenza di eventuali sintomi. In caso di presenza di ticchiolatura si consigliano interventi stoppanti con con Polisolfuro di Calcio o Bicarbonato di Potassio o Estratto integrale di Castagno a base di tannino o Sali di Rame quest'ultimo fitotossico su gruppo Pink

**Mal bianco:** su varietà sensibili o normalmente interessate dall'avversità intervenire con Zolfo e/o Bicarbonato di potassio

**Glomerella:** al momento non si segnalano sintomi accertati in campo. Proseguono i controlli ed i monitoraggi. Le prossime piogge previste potrebbero alzare il grado di rischio di sporulazione e di infezione di *Colletotrichum* che ricordiamo prende avvio con prolungate bagnature (di almeno 10-12 ore) e temperature media da 16°C a 34°C (optimum 26-28°C).

Nelle aziende che hanno concluso la difesa alla ticchiolatura ma che riscontrano le condizioni ottimali di sviluppo della malattia sopradescritte, considerare anche le ore di bagnatura da irrigazione. Ricordiamo che interventi effettuati con Bicarbonato di potassio o Rame nei confronti di ticchiolatura risultano efficaci anche per il controllo di Glomerella.

**Eulia:** il modello previsionale segnala che gli sfarfallamenti degli adulti della III generazione sono iniziati in quasi tutte le aree (0-8%); nelle aree più calde è in avvio l'ovideposizione (0-3%). Sono ancora presenti larve della generazione precedente (85-61%) che si stanno progressivamente impupando e, da metà della prossima settimana, è atteso l'inizio della nascita delle larve di III generazione nelle aree più calde. Se non si è ancora provveduto, cambiare i fondi e i feromoni nelle trappole per il monitoraggio del III volo. Al superamento della soglia di 50 catture o del 5% di getti occupati intervenire con *Bacillus t.*

**Carpocapsa:** il modello previsionale segnala la coda degli sfarfallamenti e presenza di adulti di II volo in calo (adulti ancora presenti 85-65%). L'ovideposizione varia dall'86 al 95% e la nascita larvale dal 69 all'85%. In caso di catture o al superamento dello 0,5% di frutti bacati (su un campione di 500 frutti/ha) proseguire la difesa intervenendo con Virus della granulosi o Spinosad. In caso si impieghi Virus della granulosi cambiare scelta del ceppo tra una generazione e l'altra. Eventuali impieghi di oli vegetali e minerali autorizzati per questo impiego possono avere una buona attività ovicida.

**Afide lanigero:** momento caratterizzato da calo di presenza di *Aphrelinus m.* e di *Eriosoma l.* Al superamento della soglia di 10 colonie vitali su 100 organi controllati con infestazione in atto intervenire con *Beauveria bassiana* o effettuare lavaggi con Sali Potassici di acidi grassi.

**Cemiostoma:** situazione mediamente buona. Inizio terzo volo. Continuare a monitorare la presenza sulle foglie di mine. Al superamento della soglia di due mine con larve vive per foglia nella precedente generazione intervenire con Spinosad.

**Litocollete:** situazione mediamente buona. Prosegue il III volo. Monitorare la presenza sulle foglie di mine. Due mine con larve vive per foglia giustificano l'intervento sulla seconda generazione. Al superamento di questa soglia intervenire con Azadiractina oppure Spinosad.

**Pandemis:** il modello previsionale segnala la prosecuzione degli sfarfallamenti degli adulti di II volo (7-20%) e l'inizio delle ovideposizioni in tutte le aree 2-8%. Sono presenti larve della generazione precedente (71-49%) che si stanno progressivamente impupando e dal fine settimana è atteso l'inizio delle nascite delle larve di seconda generazione nelle aree più calde.

Al superamento della soglia di 15 adulti a trappola in 2 settimane o 30 adulti come somma delle 2 specie o 5% di germogli infestati intervenire con *Bacillus t.* Sostituire fondi e feromoni delle trappole di monitoraggio.

**Archips:** proseguire il monitoraggio.

**Ragnetto rosso:** al superamento della soglia del 90% di foglie occupate dal fitofago e in assenza di predatori intervenire con Sali Potassici di Acidi Grassi o Maltodestrina.

**Cimice asiatica:** le catture di adulti risultano nuovamente in aumento confermando il progressivo incremento della presenza degli adulti di prima generazione. Le catture delle forme giovanili si mantengono sostanzialmente in linea con la settimana precedente. I monitoraggi attivi confermano nel complesso una presenza contenuta sul territorio. Le segnalazioni di danni rimangono limitate sulle drupacee in raccolta e generalmente circoscritte alle situazioni caratterizzate da fattori predisponenti alla presenza della cimice. Proseguire con attenzione i monitoraggi aziendali per intercettare tempestivamente eventuali spostamenti di adulti provenienti da colture in raccolta o da aree non gestite in particolare negli impianti più vigorosi e con vegetazione fitta, nelle aree caratterizzate da popolazioni storicamente elevate o in prossimità di siepi, boschetti e altri elementi favorevoli alla presenza della cimice. Monitorare la presenza in campo e in caso di accertata presenza intervenire con Piretrine naturali. Intervento efficace anche nei confronti di Tingide.

**Mosca delle frutta:** controllare le trappole attrattive per il monitoraggio e in caso di catture installare il sistema di attract and kill con Deltametrina o Lambdacialotrina.

## OLIVO

---

**Fase fenologica:** accrescimento frutto

**Occhio di pavone dell'olivo:** i monitoraggi evidenziano una presenza di Occhio di pavone diffusa su tutto il territorio regionale. Vista la fase fenologica in atto si consiglia di sospendere i trattamenti a base di prodotti rameici per evitare eventuali possibili danni a carico dei frutticini in formazione. In caso di forte attacco è possibile intervenire con fungicidi specifici come *Bacillus subtilis*.

**Mosca dell'olivo:** Sono iniziati i monitoraggi, della mosca olearia, sul territorio regionale. Come per le annate prece-denti sono circa 100 i punti di osservazione distribuiti nelle Province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Modena.

Nelle aziende pilota, dove sono già state installate le trappole, i rilievi hanno evidenziato i seguenti dati:

Volo adulti: assente o molto contenuto, con punte massime di 1-2 catture.

Livello infestazione: l'ovideposizione risulta assente.

Pertanto, si consigliano i seguenti interventi:

- Le aziende che attuano lotta larvicida, al momento non devono effettuare alcun trattamento.
- Le aziende che attuano il controllo con repellenti (es. caolino) o con esche avvelenate (es. Spinosad) non devono effettuare alcun trattamento.
- Le aziende che attuano il controllo della mosca con trappole a cattura massale devono montare i dispositivi.

**Tignola dell'olivo:** attualmente il lepidottero sta svolgendo la generazione carpofaga. Dai monitoraggi si rilevano catture contenute e in generale diminuzione segno che il volo degli adulti della generazione carpofaga sta volgendo al termine.

Si evidenziano assenza di nuove ovideposizioni e la presenza di larve di 1° stadio è pressoché nulla. Pertanto, le infestazioni, di questo fitofago, risultano sempre ampiamente al di sotto della soglia minima di intervento (10-12% di drupe con la presenza di un uovo sul calice del frutticino).

## PERO

---

**Fase fenologica:** ingrossamento frutti

**Colpo di fuoco:** segnalate in campo presenze. In caso di forti temporali e/o eventi grandinigeni si consiglia di intervenire entro le 24 ore con Prodotti rameici; attenzione alla fitotossicità del rame. Intervenire asportando tutti gli organi colpiti tagliando ad almeno 70 cm al di sotto del punto d'ingresso del batterio per arrestarne la diffusione lungo i vasi legnosi e provvedere alla disinfezione degli attrezzi utilizzati.



**Ticchiolatura:** si raccomanda di verificare con attenzione in campo la presenza di eventuali sintomi.. In caso di infezioni in campo si consiglia di mantenere la copertura ed effettuare interventi stoppanti con Polisolfuro di Calcio o Bicarbonato di Potassio o come corroborante Estratti integrale di castagno a base di tannino o Sali di Rame.

**Maculatura bruna:** il modello indica sporulazione in corso a seguito delle precipitazioni di sabato scorso. Le piogge di mercoledì favoriranno infezioni a partire dai conidi attualmente presenti. Ulteriori precipitazioni potranno determinare nuovi rilasci conidici e creare condizioni favorevoli alle infezioni. In relazione alla distribuzione delle precipitazioni sul territorio sono attese situazioni di rischio differenziate; nel complesso il rischio si mantiene su livelli medi, con possibili incrementi a livelli elevati nelle aree interessate da piogge frequenti e bagnature ripetute. Il monitoraggio con captaspore nel campo spia di Nonantola conferma l'incremento dei rilasci conidici a partire da domenica, con un picco inferiore rispetto ai precedenti eventi (massimo 28 conidi rilevati lunedì). In caso di piogge o bagnature prolungate intervenire con Sali di rame o Bicarbonato di potassio .

**Psilla:** situazione mediamente buona anche se disomogenea con casi anche di presenza importante. Con presenza di melata o quando il rapporto tra numero di getti con psilla e numero di getti con antocoride è maggiore di 5. Intervenire con Olio minerale (fare attenzione alla possibile fitotossicità in combinazione con altri prodotti. Al superamento della soglia intervenire con Olio minerale (tenere lontano dai trattamenti Zolfo) efficace nel contrastare il **brusone** fisiologico o Maltodestrina o eseguire lavaggi con Sali potassici di acidi grassi.

**Eulia:** il modello previsionale segnala che gli sfarfallamenti degli adulti della III generazione sono iniziati in quasi tutte le aree (0-8%); nelle aree più calde è in avvio l'ovideposizione (0-3%). Sono ancora presenti larve della generazione precedente (85-61%) che si stanno progressivamente impupando e, da metà della prossima settimana, è atteso l'inizio della nascita delle larve di III generazione nelle aree più calde. Se non si è ancora provveduto, cambiare i fondi e i feromoni nelle trappole per il monitoraggio del III volo. Al superamento della soglia di 50 catture o del 5% di getti occupati intervenire con *Bacillus t.*

**Carpocapsa:** il modello previsionale segnala la coda degli sfarfallamenti e presenza di adulti di II volo in calo (adulti ancora presenti 85-65%). L'ovideposizione varia dall'86 al 95% e la nascita larvale dal 69 all' 85%. In caso di catture o al superamento dello 0,5% ( su un campione di 500 frutti /ha ) di frutti bacati proseguire la difesa intervenendo con Virus della granulosa o Spinosad .In caso si impieghi Virus della granulosa cambiare scelta del ceppo tra una generazione e l'altra. Eventuali impieghi di oli vegetali e minerali autorizzati per questo impiego possono avere una buona attività ovicida.

**Pandemis:** il modello previsionale segnala la prosecuzione degli sfarfallamenti degli adulti di II volo (7-20%) e l'inizio delle ovideposizioni in tutte le aree 2-8%. Sono presenti larve della generazione precedente (71-49%)che si stanno progressivamente impupando e dal fine settimana è atteso l'inizio delle nascite delle larve di seconda generazione nelle aree più calde. Normalmente non sono necessari interventi con questo fitofago.

Al superamento della soglia di 15 adulti a trappola in 2 settimane o 30 adulti come somma delle 2 specie o 5% di germogli infestati intervenire con *Bacillus t.*

**Tingide:** presenza al momento modesta con stadi diversi di sviluppo dell'insetto. Verificare in campo la situazione. In questa fase sfruttare efficacia collaterale di interventi di Piretro effettuati nei confronti di afidi o cimici.

**Cimice asiatica:** le catture di adulti risultano nuovamente in aumento confermando il progressivo incremento della presenza degli adulti di prima generazione. Le catture delle forme giovanili si mantengono sostanzialmente in linea con la settimana precedente. I monitoraggi attivi confermano

nel complesso una presenza contenuta sul territorio. Le segnalazioni di danni rimangono limitate sulle drupacee in raccolta e generalmente circoscritte alle situazioni caratterizzate da fattori predisponenti alla presenza della cimice. Proseguire con attenzione i monitoraggi aziendali per intercettare tempestivamente eventuali spostamenti di adulti provenienti da colture in raccolta o da aree non gestite in particolare negli impianti più vigorosi e con vegetazione fitta, nelle aree caratterizzate da popolazioni storicamente elevate o in prossimità di siepi, boschetti e altri elementi favorevoli alla presenza della cimice. Monitorare la presenza in campo e in caso di accertata presenza intervenire con Piretrine naturali. Intervento efficace anche nei confronti di Tingide

**Ragnetto rosso** (brusone): al superamento del 60% di foglie occupate mentre su William, Conference, Kaiser, Pakam's, Guyot e Butirra precoce Morettini con temperature superiore a 28° la soglia è pari alla presenza intervenire con Olio minerale.( distanziare eventuali interventi con zolfo) oppure Maltodestrine o Sali Potassici o *Beauveria bassiana*

**Metcalfa** : presenza di adulti. Proseguire i monitoraggi . In caso di melata effettuare lavaggi.

## VITE

**Fase fenologica** : chiusura grappolo-inizio invaiatura

**Peronospora**: al momento situazione di controllo della malattia buona. L'evasione delle possibili infezioni, relative agli eventi temporaleschi dell'11 luglio, è prevista per il 16-17 luglio. Mentre per la pioggia del 15 attesa la possibile comparsa il 20-21 Luglio.Rinnovare la difesa anticipando le piogge con Rame, intervento efficace anche nei confronti di Black rot ed Escoriosi .

**Oidio**: situazione al momento buona anche se con presenza di sintoni in aumento. Mantenere la copertura o caso di condizioni favorevoli intervenire con Zolfo e/o Bicarbonato di potassio. o Olio essenziale di arancio dolce o Estratto acquoso di semi germinati di *Lupinus albus* dolce.

**Tignoletta**: situazione di campo in generale buona. I monitoraggi in campo al momento non evidenziano ne l'inizio volo ne l'ovideposizione Il modello previsionale segnala che in tutte le aree sono iniziati gli sfarfallamenti degli adulti di III volo (4-13%) ma è ancora presente il 17-7% di adulti di II volo. Nelle aree più calde stanno iniziando le ovideposizioni delle uova di III generazione (0-5%) ma è ancora presente un 3-2% di uova di II generazione. La nascita delle larve di II generazione ha raggiunto il 93-100% ed è ancora presente il 65-50% di larve di II generazione; a partire dal fine settimana inizierà anche la nascita delle larve di III generazione nelle aree più calde. Se non si è ancora provveduto, cambiare i fondi e i feromoni nelle trappole per il monitoraggio del III volo. Per la difesa si rimanda ai prossimi Bollettini.

**Cocciniglie farinose**: situazione al momento mediamente buona. Presenza primi adulti.. Monitorare la situazione in campo per valutare l'eventuale necessità di un intervento da fare in tempi brevi con Olio minerale o Maltodestrina . In caso di presenza di focolai localizzati intervenire con lanci di *Criptoleamus* e/o effettuare il secondo lancio di *Anagyrus*

**Mal dell'esca**: in aumento sintomatologia in campo.

**Flavescenza dorata** : presenza di sintomi in campo. Ricordiamo l'obbligo di estirpo per le piante colpite. Per i dettagli fare riferimento alle misure di lotta che sono contenute nella Determinazione n.

9818 del 20/05/2026 disponibile al link [Prescrizioni per la lotta contro Flavescenza dorata della vite - Fitosanitario e difesa delle produzioni - Agricoltura, caccia e pesca](#)

**Popillia Japonica** : si sconsiglia di installare le trappole di monitoraggio dell'insetto in quanto in grado di richiamarlo anche a grande distanza favorendo lo spostamento in aree non ancora interessate dal fitofago.

**Scafoideo**: prevalente presenza di adulti . Proseguono i monitoraggi territoriali. Controllare le trappole cromotropiche gialle per verificare l'efficacia degli interventi fatti allo scafoideo. Una volta effettuato il terzo intervento previsto ( con Piretrine) in caso di catture programmare un ulteriore intervento ( quarto intervento). Per le indicazioni di quest'ultimo attendere i prossimi bollettini . Per ulteriori informazioni seguire quanto riportato sul documento sottoriportato "**Difesa obbligatoria**".

### **Difesa obbligatoria**

Nel 2026, come indicato nella Determinazione del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni n. 9818 del 20/05/2026, nei vigneti a conduzione biologica dovranno essere effettuati almeno 3 trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati sulla vite contro *Scaphoideus titanus* o cicaline in genere. Si precisa che nei suddetti vigneti almeno uno dei tre trattamenti obbligatori deve essere effettuato con le piretrine naturali;

Qualora si riscontri una presenza rilevante di scafoideo si consigliano ulteriori interventi.

### **Tempistica dei trattamenti obbligatori**

La lotta obbligatoria contro *Scaphoideus titanus* dovrà essere attuata secondo le modalità stabilite dalla sopra richiamata Determinazione a partire dal 3 giugno 2026 e comunque non prima della completa sfioritura della vite e dopo avere sfalcato le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura. Il primo trattamento dovrà essere realizzato entro il 15 giugno, il secondo entro il 30 giugno e il terzo entro e non oltre il 15 luglio 2026.

### **Strategia di intervento**

Al fine di ottimizzare la difesa aumentando la selettività nei confronti degli organismi utili, riducendo l'insorgenza di resistenze e tenendo conto del meccanismo d'azione dei prodotti, le strategie di difesa indicate dal Settore fitosanitario, anche in considerazione delle linee tecniche riportate nel DTU n. 29 del Comitato Fitosanitario Nazionale approvato il 13/12/2022, delle sperimentazioni effettuate sul nostro territorio e sulla base dei rilievi effettuati sulle forme giovanili di *S. titanus*, fatto salvo quanto sopra riportato, i momenti per la realizzazione degli interventi insetticidi, le sostanze attive da impiegare e il loro posizionamento sono i seguenti:

- eseguire il primo trattamento nel periodo che va dal 3 al 10 giugno 2026; i successivi 2 trattamenti devono essere eseguiti a distanza di 7-10 giorni l'uno dall'altro. Non intervenire prima del termine del periodo della fioritura;
- privilegiare prodotti fitosanitari contenenti le piretrine naturali (scelta obbligata per almeno un trattamento); in alternativa possono essere impiegate le seguenti sostanze attive:

silicato di alluminio\*\*, azadiractina, olio essenziale di arancio dolce, sali potassici degli acidi grassi e *Beauveria bassiana*;

- qualora si utilizzino due piretrine impiegarle per il secondo e il terzo trattamento;
- se ci si limita ad una sola piretrina impiegarla per il terzo trattamento.
- Nelle fasce di rispetto (dai corpi idrici, dalle piante e dagli artropodi non bersaglio) possono essere impiegati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive silicato di alluminio\*\* e *Beauveria bassiana*.

**NOTE:**

\*\*il prodotto SURROUND® WP CROP PROTECTANT (s.a. silicato di alluminio) è autorizzato per usi di emergenza (art. 53 del Reg. 1107/2009) dal 01/04/2026 al 29 /07/ 2026.

**Accorgimenti per aumentare l'efficacia dei trattamenti**

- cimare e sfoltire la vegetazione, in modo da escludere la presenza di germogli ricadenti nell'interfilare o a terra. Queste operazioni vanno effettuate almeno due o tre giorni prima del trattamento, in modo da permettere la risalita sulle viti delle forme giovanili di *S. titanus* cadute a terra;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- effettuare un'accurata bagnatura di tutta la vegetazione, comprese le parti interne e nascoste, nonché i polloni e i ricacci lungo il fusto. A tal fine è necessario utilizzare volumi di acqua elevati (volume minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento atta a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie, dove normalmente risiede il vettore. Si consiglia di valutare la qualità della distribuzione della miscela insetticida con l'uso delle apposite cartine idrosensibili;
- rispettare tutte le prescrizioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato;
- correggere il pH della soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, di miscelare l'insetticida ad altri prodotti, sebbene compatibili;
- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne;
- praticare la spollonatura con 3 giorni di anticipo rispetto al trattamento, in modo da abbattere anche le forme giovanili in risalita dal suolo.

**Salvaguardia delle api e dell'entomofauna pronuba**

Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore serali quando l'attività dei pronubi è limitata o assente. Si sottolinea che sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi o altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi, durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. Tali trattamenti sono inoltre vietati in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi (L.R. n. 2/2019).

## **COLTURE ERBACEE**

### **TECNICHE AGRONOMICHE**

È consigliata la distribuzione di ammendanti al terreno al momento della aratura o della lavorazione più profonda. Concimi organici commerciali autorizzati possono essere distribuiti anche in occasione della preparazione del letto di semina a condizione che si conoscano i tempi di rilascio dell'azoto.

Infine, una quota di concimi organici deve essere distribuita dopo il trapianto per garantire l'apporto di nutrienti durante tutto il ciclo. In questo caso è preferibile l'apporto tramite fertirrigazione e/o concimazione fogliare.

È consigliato l'interramento dei residui di coltivazione delle precedenti colture, per favorire la mineralizzazione della biomassa vegetale e il recupero di sostanza organica nel suolo.

Si consiglia di pianificare una scelta ottimale della successione tra le colture da reddito tenendo in prioritaria considerazione la fertilità del suolo.

### **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**

---

**Fase fenologica:** maturazione

### **MAIS**

---

**Fase fenologica:** maturazione cerosa

**Piralide:** volo, ovideposizione e nascita larvale. Proseguire i monitoraggi e in caso di presenza intervenire con *Bacillus t*

**Sesamia:** monitorare in campo la presenza del fitofago.

### **SOIA**

---

**Fase fenologica:** formazione baccelli

#### **Tecniche Agronomiche**

**Ragnetto rosso:** segnalate presenze in campo. Monitorare con attenzione (campione di 100 foglie/ha) e al superamento della soglia di 0,1-0,2 acari per foglia effettuare il lancio del predatore *Phytoseiulus persimilis* in misura di 0,5-1 esemplare per mq. Al superamento della soglia di 10 forme mobili per foglia (campione di 100 foglie/ha), è possibile intervenire con Sali potassici di acidi grassi.

## **COLTURE ORTICOLE**

### **TECNICHE AGRONOMICHE**

È consigliata la distribuzione di ammendanti al terreno al momento della aratura o della lavorazione più profonda. Concimi organici commerciali autorizzati possono essere distribuiti anche in occasione della preparazione del letto di semina a condizione che si conoscano i tempi di rilascio dell'azoto.

Infine, una quota di concimi organici deve essere distribuita dopo il trapianto per garantire l'apporto di nutrienti durante tutto il ciclo. In questo caso è preferibile l'apporto tramite fertirrigazione e/o concimazione fogliare.

È consigliato l'interramento dei residui di coltivazione delle precedenti colture, per favorire la mineralizzazione della biomassa vegetale e il recupero di sostanza organica nel suolo.

Si consiglia di pianificare una scelta ottimale della successione tra le colture da reddito tenendo in prioritaria considerazione la fertilità del suolo.

### **ANGURIA (coltura in serra)**

---

**Fase fenologica:** maturazione

### **MELONE (coltura in serra)**

---

**Fase fenologica:** accrescimento-inizio maturazione

**Afidi:** alla presenza dei primi alati o delle prime colonie iniziali prima dell'accartocciamento fogliare intervenire con lanci di *Aphidius colemani* o *Crisoperla cameo* o *Aphidoletes aphidimyza* oppure intervenire con Piretrine pure o Maltodestrina o Sali potassici di Acidi Grassi

**Ragnetto rosso :** per il controllo del fitofago alla prima comparsa si consigliano lanci di *Phytoseiulus persimilis* o *Ambiloselus andersoni* o interventi con *Bauveria b.* o Maltodestrina o Sali potassici di Acidi grassi.

### **ANGURIA (coltura semiforzata)**

---

**Fase fenologica :** accrescimento-inizio maturazione

**Peronospora:** in previsione di piogge intervenire preventivamente con Sali di rame oppure *Pythium oligandrum*.

**Odio:** alla comparsa dei primi sintomi si consiglia di intervenire con Zolfo o Bicarbonato di potassio o *Bacillus pumilus* o *Bacillus amyloliquefaciens*. È possibile iniziare il programma di trattamenti con Cerevisane.



**Afidi:** si consigliano trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati o delle colonie iniziali, prima della comparsa di accartocciamenti fogliari, per poi affidare il contenimento degli attacchi alle popolazioni naturali di coccinellidi. Si consiglia di eseguire lanci con *Aphidius colemani*. In caso di assenza di popolazioni naturali di coccinellidi si consiglia di intervenire con Azadiractina, Piretrine pure o Sali potassici di acidi grassi o Maltodestrina

**Ragnetto rosso:** consigliati interventi tempestivi alla presenza dei primi focolai con *Beauveria bassiana* o Maltodestrina oppure eseguire lanci dei fitoseidi *Amblyseius andersoni* e/o *Phytoseiulus persimilis*.

## MELONE (coltura semiforzata)

---

**Fase fenologica :** accrescimento-inizio maturazione

**Peronospora:** in previsione di piogge intervenire preventivamente con Sali di rame.

**Oidio:** alla comparsa dei primi sintomi si consiglia di intervenire con Zolfo o Bicarbonato di potassio o Olio essenziale di arancio dolce o *Bacillus pumilus* o *Bacillus amyloliquefaciens*. È possibile iniziare il programma di trattamenti con Cerevisane.

**Cancro gommoso:** intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto per limitare i danni di diffusione del patogeno con *Bacillus subtilis*

**Afidi:** si consigliano trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati o delle colonie iniziali, prima della comparsa di accartocciamenti fogliari, per poi affidare il contenimento degli attacchi alle popolazioni naturali di coccinellidi. Si consiglia di eseguire lanci di *Aphidius colemani* o *Aphidoletes aphidimyza*. In caso di assenza di popolazioni naturali di coccinellidi si consiglia di intervenire con Azadiractina o Sali potassici di acidi grassi o Maltodestrina.

**Ragnetto rosso:** consigliati interventi tempestivi alla presenza dei primi focolai. Eseguire lanci di acari fitoseidi *Amblyseius andersoni* e/o *Phytoseiulus persimilis* oppure di intervenire con prodotti a base di *Beauveria bassiana* o Maltodestrina.

## POMODORO DA INDUSTRIA

---

**Fase fenologica :** accrescimento- maturazione

Riscontrati danni a seguito dei forti temporali di ieri

**Controllo infestanti** in post-trapianto è possibile provvedere alla gestione delle infestanti attraverso sarchiature fino alla chiusura della fila. Il controllo delle infestanti in post-trapianto, non appena le plantule hanno superato lo stress da trapianto (a circa 10 giorni) può essere effettuarlo meccanicamente con passaggio di erpice strigliatore.

### Difesa

**Batteriosi:** rilevati sintomi in campo, soprattutto in appezzamenti interessati da forti temporali, come quelli recentemente avvenuti, su varietà particolarmente sensibili. In previsione di piogge

intense ed eventi temporaleschi, ove presenti sintomi e per ibridi non tolleranti è possibile intervenire con *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* o COS-OGA, oppure utilizzando prodotti a base di rame. Intervento da valutare con tecnico OP.

Si ricorda che è stato concesso un uso eccezionale a IBISCO (COS-OGA) dal 20 aprile al 17 agosto 2026, specificatamente contro le batteriosi (*Pseudomonas* spp., *Xanthomonas* spp.).

**Peronospora:** al momento assenza della malattia in campo. Intervenire, in previsione di pioggia, con prodotti di copertura a base di Rame.

**Nottua gialla del pomodoro:** proseguono le catture di adulti nelle trappole di monitoraggio a feromone, con variabilità nelle diverse zone. Si sono osservati sporadici danni (fori nei frutti) e larve sulla vegetazione.. Si ricorda che la soglia indicativa di intervento corrisponde a 2 piante con presenza di uova o larve su 30 piante controllate per appezzamento. Verificare la presenza di infestazione e al superamento della soglia indicativa, con *Bacillus thuringiensis* o Virus NPV nottua gialla o Spinosad o Azadiractina.

**Ragnetto :** si rilevano presenze di infestazioni in fase iniziale lungo i bordi degli appezzamenti. L'aumento delle temperature e l'assenza di piogge favoriscono lo sviluppo delle infestazioni in questo periodo; effettuare il monitoraggio nelle zone storicamente infestate, soprattutto nelle aree perimetrali degli appezzamenti vicino a strade polverose. Valutare, in caso di presenza accertata di focolai precoci di infestazione, in accordo al tecnico OP, se intervenire in questa fase con prodotti quali Sali potassici degli acidi grassi o Olio minerale o Maltodestrina o Zolfo o Olio essenziale di arancio dolce o *Beauveria bassiana*, In alternativa, valutare la possibilità di utilizzare ausiliari come il predatore *Phytoseiulus persimilis*. Monitorare con attenzione la situazione di campo.

**Tripidi:** presenza sporadica. Effettuare il monitoraggio e intervenire alla presenza con Spinosad (max 3) o Azadiractina o Olio essenziale di arancio dolce o Sali potassici degli acidi grassi o *Beauveria Bassiana*

**Ulteriori indicazioni e consigli tecnici in merito alle di difesa e controllo delle infestanti** da utilizzare in produzione biologica per alcune colture (melo, pero, melone, zucchino e lattuga) sono disponibili al link <https://liteofbio.crpv.it/it> del progetto "LI.TE.OF.BIO: linee tecniche per l'agricoltura biologica" Misura 16.1.01 - ID: 5111593 finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Si ricorda che tutti i bollettini di produzione integrata e biologica sono disponibili sul sito del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni alle [pagine dedicate](#).

Ulteriori informazioni e l'archivio dei bollettini degli anni precedenti sono disponibili alla pagina [Bollettini di produzione integrata e biologica](#)

Bollettino realizzato con la collaborazione di: tecnici e rivendite di prodotti per l'agricoltura.