



L'EVOLUZIONE E IL RESTYLING DEL BOLLETTINO «VERDE-BLU-LILLA» AL TERZO COMPLEANNO

Reggio Emilia, 19 aprile 2016

Bollettino: le principali tappe di una storia recente

2013

- Nascita del Nuovo Bollettino Antiperonosporico

2014

- Primo compleanno: aggiornamenti tecnici apportati nel triplice manifesto

2015

- Svolta radicale: il bollettino si connota per essere ancor più salutare

2016

- Restyling 2016

2013: Novità del nuovo bollettino

1

- Impiego di miscele pronte di sostanze attive

2

- La suddivisione del bollettino in tre manifesti: A, B e C e nei relativi sottogruppi


3

- Possibilità di scegliere tra i sottogruppi

4


- Le miscele dei gruppi B e C sono corredate del valore di persistenza (gg) e della sistemica

2013: Criteri di scrematura



Prodotti inseriti nei bollettini A, B e C





Finora il passato ma com'è il presente del Bollettino?

Difesa Antiperonosporica della Vite
www.fitosanitario.re.it

Si consiglia il TRATTAMENTO N. _____

da effettuare _____

GRUPPO A: MODALITÀ DI IMPIEGO PREVENTIVA CON PRODOTTI DI COPERTURA

A1	TRADIZIONALI metiram; propineb
A2	RAMEICI idrossidi di rame; ossicloruri di rame; poltiglia bordolese; solfato tribasico; ecc.
A3	MODERNI zoxamide + rame

Si consiglia l'aggiunta di ANTIODICO tipo:
 zolfo sistemici (IBE e simili) lunga persistenza

Note: _____

ATTENZIONE: in caso di pioggia prima del trattamento utilizzare miscele pronte ad attività curativa:
 Sistemiche: a base di metalaxyl+rame, metalaxyl-m+rame, benzalaxyl+rame;
 cymoxanil+fosfati Al+rame.
 Citotropiche: a base di cymoxanil+rame.

Utilizzare i prodotti secondo le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata.
 Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522 271380 o consultare www.fitosanitario.re.it

Difesa Antiperonosporica della Vite
www.fitosanitario.re.it

Si consiglia il TRATTAMENTO N. _____

da effettuare _____

GRUPPO B: MODALITÀ DI IMPIEGO PREVENTIVA CON MISCELE PRONTE A BASSA DILAVABILITÀ

B1	MISCELE DI FENILAMIDI* metalaxyl+rame (8-9); metalaxyl-m+rame (8-9); benzalaxyl+rame (7-8)
B2	MISCELE DI QOI fenametololo+fosfati Al+iprodicarb (8-10); fenametololo+fosfati Al (8-9); pyraclostrobin+metiram (8-9); pyraclostrobin+dimetomorf (8-9); fenametololo+fosfati Al (7-8)*
B3	MISCELE DI QOI - QoSI QOI: cyazotamif+fosfati di disolfido (8-9)* QoSI: amantioctadim+metiram (8-9)
B4	MISCELE DI CAR dimetomorf+fosfati di potassio "pack" (7-8)*; dimetomorf+metiram (7-8); dimetomorf+rame (7-8); dimetomorf+zoxamide (7-8); iprodicarb+rame (7-8); mandipropamide+rame (7-8); mandipropamide+zoxamide "pack" (7-8)
B5	MISCELE VARIE CON FOSFATI AL / FOSFONATO DI POTASSIO* Riproduttori di fosfati Al (9-10); ammettadini+fosfati di potassio "pack" (8-9); cymoxanil+fosfati Al+zoxamide (8-9); cymoxanil+fosfati Al+rame (7-8); fosfati Al+rame (7-8)
B6	MISCELE ETEROGENE fluopicolide+propineb (8-9)

* Lasterico indica i sottogruppi e le miscele sistemiche che seguono l'accrescimento vegetativo.
 (*) Tra parentesi sono riportati i giorni di persistenza indicativa in situazioni di medio rischio, che andranno ridotti in presenza di precipitazioni consistenti a fine periodo.

Si consiglia l'aggiunta di ANTIODICO tipo:
 zolfo sistemici (IBE e simili) lunga persistenza

Note: _____

ATTENZIONE: in caso di pioggia prima del trattamento utilizzare miscele curative, tra quelle in tabella, a base di fenilamidi (B1) o cymoxanil+fosfati Al+rame.

Utilizzare le miscele secondo le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata.
 Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522 271380 o consultare www.fitosanitario.re.it

Difesa Antiperonosporica della Vite
www.fitosanitario.re.it

Si consiglia il TRATTAMENTO N. _____

da effettuare _____

GRUPPO C: MODALITÀ DI IMPIEGO CURATIVA CON MISCELE ENDOTERAPICHE PRONTE

C1	MISCELE CON SISTEMICI E RETROATTIVITÀ FINO AL 25% CIRCA DELL'INCUBAZIONE metalaxyl+rame (8-9); metalaxyl-m+rame (8-9)
C2	MISCELE CON SISTEMICI E RETROATTIVITÀ FINO AL 20% CIRCA DELL'INCUBAZIONE cymoxanil+fosfati Al+rame (7-8); benzalaxyl+rame (7-8)
C3	MISCELE CON CITOTROPICI E RETROATTIVITÀ FINO AL 20% CIRCA DELL'INCUBAZIONE cymoxanil+rame (5-6)

Le miscele sistemiche seguono l'accrescimento vegetativo.
 (*) Tra parentesi sono riportati i giorni di persistenza indicativa in situazioni di medio rischio, che andranno ridotti in presenza di precipitazioni consistenti a fine periodo.

Si consiglia l'aggiunta di ANTIODICO tipo:
 zolfo sistemici (IBE e simili) lunga persistenza

Note: _____

Utilizzare le miscele secondo le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata.
 Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522 271380 o consultare www.fitosanitario.re.it



Difesa Antiperonosporica della Vite

www.fitosanitario.re.it

Bollettino 2016

Fluazinam
in etichetta
dell'indicazione di pericolo
H361d "sospettato di
nuocere al feto"





Difesa Antiperonosporica della Vite

www.fitosanitario.re.it

Si consiglia il TRATTAMENTO N. _____

da effettuare _____

GRUPPO A: MODALITÀ DI IMPIEGO PREVENTIVA CON PRODOTTI DI COPERTURA

A1

TRADIZIONALI

metiram; propineb

A2

RAMEICI

idrossidi di rame; ossicloruri di rame; poltiglia bordolese;
solfato tribasico; ecc.

A3

MODERNI

zoxamide + rame

Si consiglia l'aggiunta di ANTIODIDICO tipo:

zolfo sistemici (IBE e simili) lunga persistenza

Note: _____

ATTENZIONE: in caso di pioggia prima del trattamento utilizzare miscele pronte ad attività curativa:

Sistemiche: a base di metalaxyl+rame, metalaxyl-m+rame, benalaxyl+rame;
cymoxanil+fosetil Al+rame.

Citotropiche: a base di cymoxanil+rame.

Utilizzare i prodotti secondo le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata.
Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522 271380 o consultare www.fitosanitario.re.it

Manifesto A:

Nulla è cambiato



Difesa Antiperonosporica della Vite

www.fitosanitario.re.it

GRUPPO A: MODALITÀ DI IMPIEGO PREVENTIVA CON PRODOTTI DI COPERTURA

A1

TRADIZIONALI

metiram; propineb

A2

RAMEICI

idrossidi di rame; ossicloruri di rame; poltiglia bordolese;
solfato tribasico; ecc.

A3

MODERNI

zoxamide + rame

Si consiglia il TRATTAMENTO N. _____

da effettuare _____

GRUPPO B: MODALITÀ DI IMPIEGO PREVENTIVA CON MISCELE PRONTE A BASSA DILAVABILITÀ

B1

MISCELE DI FENILAMIDI *

metalaxyl+rame (8-9); metalaxyl-m+rame (8-9); benalaxyl+rame (7-8)

B2

MISCELE DI QoI

fenamidone+fosetil AI+iprovalicarb (9-10)*; fenamidone+fosetil AI (8-9)*; pyraclostrobin+metiram (8-9); pyraclostrobin+dimetomorf (8-9); famoxadone+fosetil AI (7-8)*

B3

MISCELE DI QII - QoSI

QII: cyazofamide+fosfonato di sodio (8-9)*

QoSI: ametoctradin+metiram (8-9)

B4

MISCELE DI CAA

dimetomorf+fosfonato di potassio "pack" (7-8)*; dimetomorf+metiram (7-8); dimetomorf+rame (7-8); dimetomorf+zoaxamide (7-8); iprovalicarb+rame (7-8); mandipropamide+rame (7-8); mandipropamide+zoaxamide "pack" (7-8)

B5

MISCELE VARIE CON FOSETIL AL / FOSFONATO DI POTASSIO*

fluopicolide+fosetil AI (9-10); ametoctradin+fosfonato di potassio "pack" (8-9);

cymoxanil+fosetil AI+zoaxamide (8-9); cymoxanil+fosetil AI+rame (7-8); fosetil AI+rame (7-8)

B6

MISCELE ETEROGENEE

fluopicolide+propineb (8-9)

* L'asterisco indica i sottogruppi o le miscele sistemiche che seguono l'accrescimento vegetativo.

() Tra parentesi sono riportati i giorni di persistenza indicativa in situazioni di medio rischio, che andranno ridotti in previsione di precipitazioni consistenti a fine periodo.

Si consiglia l'aggiunta di ANTIODIDICO tipo:

zolfo sistemici (IBE e simili) lunga persistenza

Note: _____

ATTENZIONE: in caso di pioggia prima del trattamento utilizzare miscele curative, tra quelle in tabella, a base di fenilamidi (B1) o cymoxanil+fosetil AI+rame.

Utilizzare le miscele secondo le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata.
Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522 271380 o consultare www.fitosanitario.re.it

Manifesto B:

Analizziamo ciò che è cambiato

Manifesto B

I cambiamenti riguardano il sottogruppo B3

B3

MISCELE DI Qil - QoSI

Qil: cyazofamide+fosfonato di disodio (8-9)*

QoSI: ametoctradin+metiram (8-9)

Manifesto B

I cambiamenti riguardano il sottogruppo B4

OUT

B4

MISCELE DI CAA

dimetomorf+fosfonato di potassio (7-8); dimetomorf+metiram (7-8); dimetomorf+rame (7-8);
dimetomorf+zoxamide (7-8); dimetomorf+metiram (7-8); mandipropamide+rame (7-8);
mandipropamide+metiram (7-8); mandipropamide+rame (7-8);
mandipropamide+metiram+rame (7-8)

La miscela **bentiavalicarb+rame** in conseguenza dell'attribuzione in etichetta dell'indicazione di pericolo H351 "sospettato di provocare il cancro"

Sottogruppo B4

Manifesto B

I cambiamenti riguardano il sottogruppo B6

OUT

B6

MISCELE ETEROGENEE

fluopicolide+propineb

La miscela **cymoxanil+zoxamide** in conseguenza dell'indicazione di pericolo H361 fd "Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto"

Sottogruppo B6

Si consiglia il TRATTAMENTO N. _____

da effettuare _____

GRUPPO C: MODALITÀ DI IMPIEGO CURATIVA CON MISCELE ENDOTERAPICHE PRONTE

C1

MISCELE CON SISTEMICI E RETROATTIVITÀ FINO AL 25% CIRCA DELL'INCUBAZIONE
metalaxyl+rame (8-9); metalaxyl-m+rame (8-9)

C2

MISCELE CON SISTEMICI E RETROATTIVITÀ FINO AL 20% CIRCA DELL'INCUBAZIONE
cymoxanil+fosetil Al+rame (7-8); benalaxyl+rame (7-8)

C3

MISCELE CON CITOTROPICI E RETROATTIVITÀ FINO AL 20% CIRCA DELL'INCUBAZIONE
cymoxanil+rame (5-6)

Le miscele sistemiche seguono l'accrescimento vegetativo.

() Tra parentesi sono riportati i giorni di persistenza indicativa in situazioni di medio rischio, che andranno ridotti in previsione di precipitazioni consistenti a fine periodo.

Si consiglia l'aggiunta di ANTIIDICO tipo:

zolfo sistemici (IBE e simili) lunga persistenza

Note: _____

Utilizzare le miscele secondo le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata.
Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522 271380 o consultare www.fitosanitario.re.it

Manifesto C:

Analizziamo i cambiamenti

Esclusione che interessano il sottogruppo C2

C2

MISCELE CON SISTEMICI E RETROA
cymoxanil+fosetil Al+rame (7

OUT

Esclusione della miscela
cymoxanil+fosetil Al+zoxamide
poiché l'etichetta ne prevede
l'impiego solo preventivo

Sottogruppo C2

Esclusione che interessano il sottogruppo C3

C3


MISCELE CON CITOTROPICHE

cymoxanil+rame (5-6)

OUT

Sottogruppo C3

Esclusione della miscela **cymoxanil+zoxamide** poiché l'etichetta riporta l'indicazione di pericolo H361fd "Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto"

A close-up photograph of a large, vibrant green grape leaf with prominent veins. A red arrow points from the text 'Grazie per l' attenzione' to a small, faint brown spot on the leaf's surface. The background shows other grape leaves and clusters of small green grapes.

Grazie per l'

attenzione