




I fitofagi minori della vite, occasionalmente e potenziali agenti di danno

Dott. Pasquale Mazio

Le altre cicaline (della vite)



- La cicalina nord-americana della vite, per caratteristiche ed abitudini, si inserisce di diritto tra le classiche cicaline della vite, insieme a quella verde (*Empoasca vitis*) e a quella gialla (*Zygina rhamni*)

Cicaline crescono

Erasmoneura vulnerata

di Pasquale Mazio


Erasmoneura (=Erythroneura) vulnerata - cicadellide tiflocibino (Cicalina nord-americana della vite), originario degli USA, è stato rilevato per la prima volta in Europa a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, nel 2004 (Girolami *et al.*, 2006). Negli anni successivi, la cicalina è stata ritrovata in Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna (Duso *et al.*, 2008). In provincia di Reggio Emilia abbiamo avuto i primi riscontri della sua presenza quest'anno, durante i monitoraggi nei vigneti del check-up. Sembra compiere tre generazioni l'anno. L'adulto, di circa 3 mm, presenta la colorazione delle ali bruno-verdastre, con macchie azzurre ed una venatura rossa a forma di Y nel terzo distale (vedi fig. 1).



Figura 1. Esemplare di *E. vulnerata* catturato in provincia di Reggio Emilia su trappola cromotopica (foto P. Mazio)



Gli altri Rincoti



Dictyophara europaea

- Polifago, è possibile trovarlo su *Amaranthus retroflexus*, *Urtica dioica* e *Clematis vitalba*
- Positivo a FD e BN
- Riconosciuto vettore della flavescenza dorata
- Possibile ruolo di vettore per il fitoplasma della FD da clematide (e altri ospiti alternativi della FD) a vite.




Acanalonia conica



- Origine nord-americana, rinvenuta in Italia dal 2004, prima in provincia di PD, poi CO e PV; nel 2009 in FVG...
- Intercettata da noi, in provincia di RE, nel 2016
- Ciclo e comportamento analoghi a metcalfa
- Estremamente polifaga (Liliacee, Rosacee, Vitacee, Ulmacee, Juglandacee, Labiate, Chenopodiacee, Oleacee, ecc.)
- Si ritiene che un'eventuale esplosione della sua presenza potrebbe arrecare intensi danni, come avvenne per metcalfa all'inizio della sua introduzione in Italia.



Gli altri lepidotteri



Gli altri in «ordine» sparso





Cavallette

- Varie specie; nella Bassa reggiana abbiamo, in particolare, intercettato fin dal 2010 l'Orthoptera Ensifera Tettigoniidae *Phaneroptera nana nana*
- Specie univoltina, polifaga, risulta costantemente presente su vite
- I danni su foglia e grappolo, generalmente, non sono tali da richiedere un intervento







Difesa Antiperonosporica della Vite

www.fitosanitario.re.it

Difesa Antiperonosporica della Vite
www.fitosanitario.re.it - tel. 0522 271380

Si consiglia il TRATTAMENTO N.

da effettuare

GRUPPO 8: MODALITÀ DI IMPIEGO PREVENTIVA CON MISCELE A BASSA DILAVABILITÀ

01	[Small text]
02	[Small text]
03	[Small text]
04	[Small text]
05	[Small text]
06	[Small text]
07	[Small text]

Si consiglia l'applicazione di ANTIODICO tipo:

☐ zolfo ☐ idrossido (SSE e simili) ☐ fungo sistemico

Nota:

ATTENZIONE: la cura di prima scelta nei vigneti coltivati con vitigni sensibili come Pinot di Chianti, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, ecc. deve essere effettuata con cautela.





Fitogram

Fitogram_bot su Telegram



Fitoclimate

www.fitosanitario.re.it

