

Comunicato del 10 agosto 2015

ATTENZIONE: PER TUTTI GLI INTERVENTI VERIFICARE I TEMPI DI CARENZA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Apertura di settimana con possibili precipitazioni temporalesche. Nuovo possibile peggioramento a fine periodo.

CIMICI E MIRIDI: si raccomanda di verificare con frequenza la situazione aziendale per identificare la possibile presenza di *Halyomorpha*.

Valutare attentamente anche gli sfalci dei campi limitrofi per possibili migrazioni di miridi.

Se necessario ricorrere ad interventi per altri fitofagi che siano attivi anche verso questi insetti (es. clorpirifos metile o etofenprox concesso in deroga in PI).

MELO E PERO –ingrossamento frutto, raccolta-

MACULATURA BRUNA: mantenere opportuna protezione, anche in considerazione della presenza segnalata in alcuni campi. In presenza di **TICCHIOLATURA**, ricorrere a prodotti a duplice valenza per contenere le infezioni secondarie.

OIDIO: intervenire preferibilmente con zolfo

COLPO DI FUOCO: in caso di infezioni asportare tempestivamente ogni organo colpito.

CARPOCAPSA: è iniziato il terzo volo. Programmare interventi larvicidi al superamento soglia.

EULIA e RICAMATORI: presenza di adulti rilevata sul territorio in modo disforme ma complessivamente modesta.

Possibili interventi larvicidi saranno da posizionarsi a superamento soglia.

PSILLA: monitorare la situazione aziendale e in caso di necessità intervenire con olio bianco estivo. Con melata sono consigliati lavaggi.

DRUPACEE-raccolta-

MONILIA: all'insorgere di condizioni climatiche favorevoli è possibile intervenire con prodotti specifici (verificare le singole registrazioni)

• **PESCO**

CIDIA MOLESTA e ANARSIA: al superamento della soglia intervenire con prodotti larvicidi a base di *Bacillus thuringiensis* spinosad, thiacloprid, etofenprox, indoxacarb o emamectina.

• **SUSINO**

CIDIA FUNEBRANA: presenza di adulti. Compatibilmente con i tempi di carenza dopo 4-5 giorni da superamento soglia (10 catture/trappola/settimana) intervenire con emamectina, thiacloprid, fosmet, etofenprox o spinosad

VITE- invaiatura

FLAVESCENZA DORATA e MAL DELL'ESCA. Rimuovere tempestivamente la vegetazione sintomatica.

BOTRITE: sulle varietà sensibili intervenire con: fluopiram, fluazinam, fenexamid, pirimetanil, fludioxonil+ciprodinil, fenpirazamine, boscalid o aureobasidium pullulans, *Bacillus amyloliquefaciens* o *subtilis*, bicarbonato di K

PERONOSPORA: a protezione soprattutto delle femminelle può rendersi necessario un ulteriore intervento a base di rame. Aggiungere zolfo per la contemporanea difesa da oidio.

TIGNOLETTA: presenza di uova e larve. Al superamento soglia (5% grappoli infestati) si raccomanda un intervento con: bacillus thuringiensis, emamectina o spinosad

COCCINIGLIA: in alcuni contesti si segnala la presenza di reinfestazioni.