Aspetto fisiologico: il punto di partenza: 'Se', 'quando' e 'quanto' irrigare la vite

Stefano Poni

**Istituto di Frutti-Viticoltura, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Piacenza.**

**Il clima sta
cambiando?**

Geisenheim {Germany, 50 N}

Da Schultz, 2000

Irrigazione “ordinaria”

Di solito meno di 400 mm/anno. In estate non piove quasi MAI!
(es. California)

Irrigazione “straordinaria”

Piuvosità annuale più elevata e, in estate, PUO' anche piovere in modo irregolare e/o abbondante

Vigneti di pianura

(produzione e vigoria elevate, qualità da migliorare)

Vigneti di collina

(resa e vigoria più basse, qualità spesso già buona, si cerca l'eccellenza)

Si legge da un certo disciplinare di produzione....

.....i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

E' vietata ogni pratica di irrigazione e di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la.....

.....e da un altro.....

..è' vietata ogni pratica di forzatura. **E' ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'invasatura.**

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini.....

Se si vuole capire bene il “se”, occorre analizzare i fattori che contribuiscono al bilancio idrico del vigneto

- ✓ **Terreno – gestione del suolo**
- ✓ **Clima**
- ✓ **Forma di allevamento**
- ✓ **Orientamento dei filari**
- ✓ **Carica di uva**

Tabella 1. Valori orientativi di quantità di acqua disponibile in vari tipi di suoli a diversa tessitura (da Shockley, 1956).

Tessitura	Acqua disponibile (mm per metro di suolo)	
	Intervallo	Media
Sabbia grossolana	33-42	36
Sabbioso-limoso	62-83	67
Medio impasto, leggero	83-125	104
Limoso	125-192	158
Argilloso-limoso	146-208	175
Argilloso	133-208	167

CIC = 34,6 % Vol

PA = 17,8 % Vol

AD = 160 mm/m

DA = 1,30 g/cm³

Ripreso da Lopes et al., 2004. Geisenheim, Germania

Specie	18h Σ 8h (1 m ⁻² LA)	LAI (m ² m ⁻²)	Trasp. (mm gg ⁻¹)
Medicago lupulina	1.94	1.28	2.48
Festuca rubra	0.60	1.18	0.71
Chenopodium album	2.93	0.76	2.21
Cirsium arvense	1.74	1.22	2.12
Malva neglecta	4.79	0.93	4.45
Taraxacum officinale	2.08	1.38	2.48
Vite	0.46	2.31	0.89

Barbera, year 2002

Same vineyard...year 2003.....

Tendone

Cordone speronato

La luce intercettata e la traspirazione
sono correlate

Da Mattii et al., 2004

NS vs. EW

'se' irrigare.....

Per capire “se” e il caso di irrigare, specie in un’area di fertile di pianura, bisogna capire “se” lo stress idrico effettivamente c’è e se è di gravità tale da compromettere la funzionalità della foglia. Infatti, come è noto, uno stress idrico leggero o moderato, in un ambiente di questo genere, può anche tornare utile.....

- ❑ Bilancio idrico tradizionale
- ❑ Analisi visiva o tattile del terreno o di organi epigei
- ❑ Misura del contenuto idrico del suolo
- ❑ Misura del potenziale idrico del suolo
- ❑ Misura dello stato idrico della pianta o di organi specifici

Tabella 5. Un esempio di bilancio idrico basato sul calcolo di ETe che ipotizza l'intervento irriguo quando la AD (127 mm/m) si è ridotta del 50%

Giorno	H ₂ O nel terreno (mm/m)	ET _e (mm)	Variazione (mm)	Apporti (mm)
0	127	-	-	0
3	117.7	2.6	- 2.6	0
6	107.2	4.1	- 4.1	3
11	102.7	2.5	+ 9.5	12
12	104	2.7	+ 1.3	4
23	64.2	2.8	- 2.8	0
24	124.3	2.9	+ 60.1	63
26	117.3	3.5	- 3.5	0

Dati ripresi da....

Scouting for water stress

Active shoot growth

No shoot growth

No stress –
normal leaf angle

Stressed – vertical
leaves

Very stressed –
“escaping” leaves

WSN Soil Sensors

Image Credits: Decagon.com

Fotosintesi netta ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$)

Potenziale idrico fogliare

Image credits : Soilmoisture.com

Image credits : Bernizzoni F. 2012

In California (San Joaquin, Napa and Sonoma Valley) the most common method for identifying the timing of first irrigation is based on **mid-day leaf water potential**

On white cultivars, the threshold is around -10 bars (-1.0 MPa)

On red cultivars, the threshold is around -12 bars (-1.2 MPa)

'quando' irrigare.....

Il “quando” dipende soprattutto da due considerazioni:

- 1) La suscettibilità della vite allo stress idrico a seconda della fase fenologica che attraversa.
- 2) Gli obiettivi che si perseguono con la gestione dell'irrigazione.

Shiraz

Control

Stress
pre-veraison

Stress
post-veraison

Riel. da Hardie e Considine, 1976

Berry skinburn damage!

Sangiovese

Verdicchio

Trebbiano t.

‘quanto’ irrigare.....

Il “quanto” dipende soprattutto dalla figura che segue.....e che racchiude in sè il concetto, importantissimo, dello “stress idrico controllato”

Fotosintesi netta ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$)

da Williams, 1994

cv. Sultana

Il ruolo del calcio

- La carenza di Ca^{++} può certamente causare una riduzione di spessore della parete cellulare che aumenta la suscettibilità allo "spacco" e/o alle malattie.
- Il Ca^{++} si muove quasi esclusivamente per via "xilematica". Pertanto applicazioni al terreno tendono a spostare l'elemento dalle radici alle foglie, luogo preferenziale di fissazione. Può essere un problema nella vite.
- Certamente applicazioni di calcio alla chioma, ed in particolare ai grappoli, effettuate in fioritura o in fase di acino "verde", possono essere efficaci per creare acini più coriacei.
- Irrorazioni di Ca^{++} in uva da tavola spesso utilizzate per aumentare la resistenza alla conservazione.

Weather data

Plant water status

Soil water status (either moisture or potential)

Un modello a «serbatoio» di bilancio idrico

Sistemi di allevamento

Guyot

Cordone speronato

Water Balance Yr. 2012 [Guyot vs CS]

Guyot

2012 / 06 / 20

Water Content

2012 / 07 / 20

Water Content

2012 / 08 / 10

Water Content

2012 / 08 / 24

Water Content

CS

Water Content

Water Content

Water Content

Water Content

Seasonal evolution of Leaf Water Potential Yr. 2012

Seasonal evolution of Pn and gs Yr. 2012

DSS Dashboard

'come' irrigare.....

Lascio la parola agli altri relatori.....

**Grazie
dell'attenzione**