Albinea
6 Dicembre 2012

Gestione dell'irrigazione per la qualità in vigneto

L'uso corretto della microirrigazione

**ANNO 2012:
QUANDO IRRIGARE LA VITE
DIVENTA UN'ESIGENZA**

Federica Gaiotti

CRA
CENTRO DI RICERCA PER LA
VITICOLTURA - CONEGLIANO

BONATTI
Irrigazioni s.r.l.

Cambiamenti climatici: incremento delle temperature

Analisi storica delle delle temp. max, medie e minime da aprile a ottobre a Conegliano (TV)

Dalla metà degli anni 1980 evidente incremento delle temperature

Cambiamenti climatici: precipitazioni

Analisi storica delle precipitazioni in veneto durante i mesi della maturazione e durante il periodo vegetativo

Cambiamenti climatici: distribuzione precipitazioni

Precipitazioni Conegliano (TV) - 2012

Cambiamenti climatici e irrigazione

Conseguenze per la vite

- Aumento dell'evapo-traspirazione
- Minor riserva idrica nei suoli

Stress idrico

NUOVA CONCEZIONE DELL' IRRIGAZIONE

IERI

**Tecnica di forzatura
Mezzo di soccorso**

OGGI

**Strumento per garantire la
stabilità e la qualità delle
produzioni viticole**

Sostenibilità nella gestione dell'irrigazione

- Contenimento dei costi
- Salvaguardia delle risorse idriche → Riduzione dei volumi idrici utilizzati

Scorrimento superficiale

Aspersione soprachioma

La tecnica irrigua

- **Alti costi di gestione**
- **Elevati volumi idrici**
- **Basse efficienze**

La tecnica irrigua

MICROSPRINKLER

SUBIRRIGAZIONE

**MICROIRRIGAZIONE
A GOCCIA**

I VANTAGGI DELLA MICROIRRIGAZIONE

- Ridotta richiesta idrica
- Risparmio energetico (bassi volumi e basse pressioni d'esercizio)
- Bassi costi di manodopera
- Possibilità di intervenire tempestivamente nelle fasi fenologiche più critiche
- Estrema versatilità portate (1-8 l/h)
- Possibilità di adottare stress idrico controllato
- Possibilità di attuare la fertirrigazione
- Transitabilità totale del vigneto nel corso delle irrigazioni
- Non bagnando la vegetazione non favorisce lo sviluppo di crittogame

VANTAGGI DELLA SUBIRRIGAZIONE

- Assenza totale di ostacoli alla gestione meccanizzata (vendemmia, potatura, spollonatura)
- Minor costi di manutenzione e maggior durata degli impianti
- Non bagnatura della superficie del terreno → minor sviluppo erbe infestanti
- Volume di bagnatura del suolo oltre 40% superiore all'irrigazione a goccia fuori terra
- Localizzazione degli apporti → riduzione delle perdite (evaporazione, percolazione, scorrimento superficiale)

VANTAGGI DELLA SUBIRRIGAZIONE

➤ E' la tecnica che ha la più elevata efficienza di utilizzo dell'acqua

Tipo di irrigazione	Per aspersione soprachioma con impianti fissi	Microsprinkler	Microirrigazione a goccia	Subirrigazione
Rapporto di irrigazione caratterizzante l'impianto (mm/h/Ha)	9,20÷9,45	5,80÷5,90	1,25÷1,30	1,25÷1,30
Tempi (ore/ha/stagione)	18÷22	25÷31	- 40-50%	85÷110
Quantità d'acqua somministrata (m ³ /ha/stagione)	1.800÷2.100	1.600÷1.900	1.300÷1.600	1.100÷1.500
Efficienza del metodo irriguo	0,60÷0,75	0,75÷0,85	0,93÷0,97	0,95÷0,98

Costi e consumi a ettaro di diversi sistemi di irrigazione (ipotesi di una azienda di 10 Ha di superficie irrigabile/coltivata, corpo unico con approvvigionamento idrico tramite pozzo con pompa elettrica e senza limitazione nell'approvvigionamento idrico, sistema di filtraggio idrociclone più dischi manuale

Quali elementi considerare per:

- 1- Effettuare corrette scelte impiantistiche
- 2- Gestire correttamente l'irrigazione

1. Clima, suolo e interazioni acqua-suolo-radici

IL CLIMA

IL SUOLO

INTERAZIONI ACQUA-
SUOLO-RADICI

2. Esigenze idriche della coltura (sensibilità della varietà allo stress idrico, forma di allevamento, densità d'impianto, etc)

3. Sensibilità della vite allo stress idrico in relazione alla fase fenologica

Relazione acqua-suolo

A parità di precipitazioni o di acqua fornita tramite irrigazione, la quantità di acqua che un suolo è in grado di trattenere e rendere disponibile per la pianta dipende dalla tessitura e dalla profondità del suolo.

Relazione acqua-suolo

- **Analisi fisico-chimica**
- **Analisi idrologica**

Fondamentali per:

- Stimare la capacità d'acqua che il suolo è in grado di immagazzinare
- Calcolare i volumi e i turni irrigui

➤ **Con l'irrigazione del terreno dovremmo mantenere il contenuto idrico tra la capacità di campo e la soglia critica**

Relazione acqua-suolo-radici

Suolo sabbioso
(Colli orientali -Friuli)

**Suolo sabbioso, con scheletro
abbondante** (Jerzu – Sardegna)

Lo strato superficiale di suolo tende a disidratarsi rapidamente → radici si sviluppano in profondità

Relazione acqua-suolo-radici

Suolo franco-argilloso (Castelcerino - VR)

Suolo argilloso (Rugate - VR)

- In terreni pesanti → maggior resistenza alla penetrazione degli apparati radicali negli strati più profondi
- Crescita radicale concentrata soprattutto negli strati più superficiali

Relazione acqua-suolo-radici

Presenza di impedimenti all'approfondimento radicale

Ramera (TV)

Colli Orietali - Friuli

- La profondità delle radici influenza la capacità idrica totale.
- In suoli dove l'apparato radicale è confinato agli strati più superficiali solo una quota dell'acqua disponibile può essere utilizzata dalla vite

Anche in suoli argillosi la vite può subire stress idrico!

Relazione acqua-suolo-radici

CREPACCIATURA DEI SUOLI ARGILLOSI:

Aumenta le perdite idriche per evaporazione e infiltrazione profonda

→ Importante intervenire con l'irrigazione prima della formazione di crepaccature

Conoscere il suolo per le scelte impiantistiche

DISTANZA DEI GOCCIOLATORI: minimo 40 cm nei suoli più sciolti, massimo 100 cm in quelli più pesanti

PORTATA: adeguata alla velocità di movimento dell'acqua (infiltrazione, capillarità) per evitare perdite in profondità. Per irrigazione qualitativa orientarsi verso portate basse (1-2 L/ora).

➤ *Importante considerare i picchi massimi di fabbisogno idrico in base alla varietà, forma di allevamento, sesto di impianto*

Localizzazione dell'ala irrigua

PROFONDITA'

DELL'ALA : **30-40 cm**

- strato di suolo dove sono maggiormente concentrate le radici
- effetto inibente crescita piante spontanee

DISTANZA DAL FILARE :

Prova sperimentale zona Tezze di Piave (TV), varietà Merlot:

- Subirrigazione con ala a **40** cm dal filare
- Subirrigazione con ala a **90** cm dal filare
- Subirrigazione con ala a **135** cm dal filare

SUBIRRIGAZIONE A 40 cm DAL FILARE

SUBIRRIGAZIONE A 135 cm DAL FILARE

**SUBIRRIGAZIONE A 40 cm
dal filare**

**SUBIRRIGAZIONE A 135 cm
dal filare**

Ala irrigua

40 cm

5 m

Ala irrigua

Localizzazione dell'ala irrigua

- Posizionando l'ala lontano dal ceppo la vite deve investire maggior energia nella produzione di radici
- Sottrazione di risorse alla chioma, con conseguenze sullo sviluppo vegetativo e sulla produzione

Tesi	Produzione/ pianta (Kg)	Zuccheri (Brix)	Acidità (g/l)	pH
ala 135	3,51 b	20,21 ns	5,1 ns	3,37 b
ala 90	3,34 b	20,31 ns	5,1 ns	3,37 b
ala 40	4,05 a	20,64 ns	4,8 ns	3,42 a

Gestione della subirrigazione: quando irrigare?

Non recuperare situazioni di stress idrico, ma prevenirle

- Non aspettare la comparsa di sintomi evidenti di stress (arresto di sviluppo degli apici vegetativi, disseccamento dei viticci, ingiallimento delle foglie basali, etc)
- Iniziare ad irrigare in anticipo rispetto ai metodi tradizionali
- Irrigare con modeste quantità

Gestione della subirrigazione: quando irrigare?

- Metodi basati sul **contenuto idrico del suolo** (TDR, tensiometri, sonda a neutroni) o sul **contenuto idrico della pianta** (es. potenziale idrico fogliare) → *difficilmente applicabili a livello aziendale*
- Metodi basati sull' **osservazione delle piante** (perdita di turgidità dei germogli e delle foglie, angolo di inclinazione delle foglie) → *richiedono esperienza e conoscenza della sensibilità varietale allo stress idrico*
- Metodi basati sul calcolo del **bilancio idrico**

INGRESSI

*Acqua presente
nel suolo,
irrigazioni, piogge*

-

PERDITE

*Acqua utilizzata
dal sistema
colturale*

**CALCOLO
FABBISOGNI
IDRICI**

Gestione della subirrigazione: quando irrigare?

- Effettuare **irrigazioni fisiologiche** (in fasi di sviluppo in cui la pianta è particolarmente sensibile allo stress) → ALLEGAGIONE- INVAIATURA
- Valutare la possibilità di adottare lo **stress idrico controllato**

Varietà a bacca nera

FERTIRRIGAZIONE

Permette di massimizzare l'efficienza degli interventi di concimazione e irrigazione

- Ottimizzazione della tempistica degli apporti nutritivi
- sincronizzazione domanda/offerta nelle diverse fasi fenologiche

Quantitativi totali e frazionati dei principali elementi nutritivi distribuiti nelle varie fasi fenologiche mediante fertirrigazione sulla cv Merlot – Zona DOC Piave

Fertirrigazione

Varietà Merlot, zona DOC Piave (TV) – dati 2011

- Carichi produttivi superiori (+12%) rispetto alla concimazione tradizionale
- Zuccheri e acidità pari alla concimazione tradizionale
- +5-10% di sostanze coloranti

Fertirrigazione

Precursori d'aroma nelle uve di Pinot. g in viti concimate in modo tradizionale e fertirrigate

- 1:0,5 az. Tesi granulare aziendale
- 1:05 fertirrigaz.
- 1:1 fertirrigaz.

Dati da Bigot (2011)

Federica Gaiotti – CRA-VIT

Grazie per l'attenzione