

PERONOSPORA 2008:
UN ANNO DA
RICORDARE?


Strategia 2008:
come e perché dei
bollettini
antiperonosporici

21 novembre 2008



Come nasce il bollettino antiperonosporico


Precipitazioni e temperature rilevate dalle capannine



Previsioni meteo



Sopralluoghi quotidiani



Riunione quotidiana



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Consorzio Fitosanitario Provinciale

di Reggio Emilia

Difesa Vite

**Si consiglia il Trattamento N.
da effettuare.....**

PERONOSPORA

Modalità di impiego dei prodotti indicati con la crocetta:

- (A) preventiva tradizionale:**
RAMEICI, MANCOZEB, METIRAM O MISCELE TRA LORO
- (B) preventiva a bassa dilavabilità:**
MISCELE DI: BENALAXYL, BENALAXYL-M, CYAZOFAMIDE, DIMETOMORF, FAMOXADONE, FOSEIL AL, IPROVALICARB, METALAXIL-M, PYRACLOSTROBIN, ZOXAMIDE
- (C) curativa e/o preventiva (situazioni particolari):**
MISCELE DI: CYMOXANIL (ESCLUSA QUELLA CON FAMOXADONE), METALAXYL-M, BENALAXIL, BENALAXIL-M, DIMETOMORF e IPROVALICARB (SOLO MISCELA CON MANCOZEB E FOSETIL AL).
- (D) preventiva con rameici:**
POLTIGLIA BORDOLESE, OSSICLORURO, IDROSSIDO ecc.

ATTENZIONE: in caso di pioggia appena prima del trattamento utilizzare i prodotti DEL GRUPPO C.

OIDIO



zolfo bagnabile



lunga persistenza

Note:

N.B.: Si consiglia di usare solo come preventivi, per non più di tre interventi come loro somma totale i principi attivi: Famoxadone, Fenamidone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin (antiodico).



Per ulteriori informazioni chiamare il 0522271380, o 0522444680 o consultare:
www.fitosanitario.re.it

BOLLETTINI ANTI-PERONOSPORICI 2008

1	Prod. Copertura (A)	29 aprile
2	Prod. Copertura (A)	10-11 maggio
3	Prod. Copertura (A)	16 maggio
4	Prod. Curativi (C)	Entro 21 maggio
5	Prod. Curativi (C)	Entro 29 maggio
6	Prod. Curativi (C)	Entro 7 giugno
7	Prod. Curativi (C)	Entro 16 giugno
8	Prod. Rameici (D)	Entro 25 giugno
9	Prod. Rameici (D)	Entro 3 luglio
10	Prod. Rameici (D)	Entro 11 luglio
11	Prod. Rameici (D)	Entro 18 luglio
12	Prod. Rameici (D)	Entro 26 luglio
13	Prod. Rameici (D)	Entro 4 agosto
14	Prod. Rameici (D)	Entro 11 agosto



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Consorzio Fitosanitario Provinciale

di Reggio Emilia

Difesa Vite

**Si consiglia il Trattamento N.
da effettuare.....**

PERONOSPORA

Modalità di impiego dei prodotti indicati con la crocetta:



preventiva tradizionale:

RAMEICI, MANCOZEB, METIRAM O MISCELE TRA LORO



preventiva a bassa dilavabilità:

MISCELE DI: BENALAXYL, BENALAXYL-M, CYAZOFAMIDE, DIMETOMORF, FAMOXADONE, FOSEIL AL, IPROVALICARB, METALAXIL-M, PYRACLOSTROBIN, ZOXAMIDE



curativa e/o preventiva (situazioni particolari):

MISCELE DI: CYMOXANIL (ESCLUSA QUELLA CON FAMOXADONE), METALAXYL-M, BENALAXIL, BENALAXIL-M, DIMETOMORF e IPROVALICARB (SOLO MISCELA CON MANCOZEB E FOSETIL AL).



preventiva con rameici:

POLTIGLIA BORDOLESE, OSSICLORURO, IDROSSIDO ecc.

ATTENZIONE: in caso di pioggia appena prima del trattamento utilizzare i prodotti DEL GRUPPO C.

OIDIO



zolfo bagnabile



lunga persistenza

Note:

N.B.: Si consiglia di usare solo come preventivi, per non più di tre interventi come loro somma totale i principi attivi: Famoxadone, Fenamidone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin (antioidico).



Per ulteriori informazioni chiamare il 0522271380, Q 0522444680 o consultare:

www.fitosanitario.re.it

Come viene divulgato il bollettino antiperonosporico



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Consorzio Fitosanitario Provinciale

di Reggio Emilia

Difesa Vite

Si consiglia il Trattamento N.
da effettuare.....

PERONOSPORA

Modalità di impiego dei prodotti indicati con la crocetta:

- (A) preventiva tradizionale:**
RAMEICI, MANCOZEB, METIRAM O MISCELE TRA LORO
- (B) preventiva a bassa dilavabilità:**
MISCELE DI: BENALAXYL, BENALAXYL-M, CYAZOFAMIDE, DIMETOMORF, FAMOXADONE, FOSEIL AL, IPROVALICARB, METALAXIL-M, PYRACLOSTROBIN, ZOXAMIDE
- (C) curativa e/o preventiva (situazioni particolari):**
MISCELE DI: CYMOXANIL (ESCLUSA QUELLA CON FAMOXADONE), METALAXYL-M, BENALAXIL, BENALAXIL-M, DIMETOMORF e IPROVALICARB (SOLO MISCELA CON MANCOZEB E FOSSETIL AL).
- (D) preventiva con rameici:**
POLTIGLIA BORDOLESE, OSSICLORURO, IDROSSIDO ecc.

ATTENZIONE: in caso di pioggia appena prima del trattamento utilizzare i prodotti DEL GRUPPO C.

OIDIO

☐ zolfo bagnabile ☐ lunga persistenza

Note:

N.B.: Si consiglia di usare solo come preventivi, per non più di tre interventi come loro somma totale i principi attivi: Famoxadone, Fenamidone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin (antioidico).



Per ulteriori informazioni chiamare il 0522271380, Q 0522444680 o consultare:
www.fitosanitario.re.it

**350 punti
affissione**



**Sito
web**



**Servizio
SMS**




Televideo



**Per una conduzione della campagna
di difesa antiperonosporica della vite
più avveduta ed informata**

GESTPER 2.0
di Graziano Oliva



Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

Home Page



ULTIM'ORA

"CONOSCERE IL FORMULATO":
da oggi è disponibile il nuovo
servizio rivolto a tutti i viticoltori.
Per maggiori informazioni clicca qui

Indicazioni di Difesa

Ricerca

Ricerca nel sito e trova
subito le informazioni che
desideri ...

» Cerca

INDICAZIONI DI DIFESA

Per consultare il bollettino
antiperonosporico **N. 7** clicca
qui

News



**Bollettino di Lotta
integrata**

utili indicazioni di
difesa per varie
colture. Scarica il
N.20



**Bollettino
antiperonosporico**

Bollettino
antiperonosporico **N. 7**



**Interventi contro i
giallumi della vite**

interventi nel mese di
giugno

22.06.2007

- [Consorzio](#)
- [Ruoli contributivi](#)
- [Indicazioni di Difesa](#)
- [Servizio SMS](#)
- [Lotte obbligatorie](#)
- [Verde ornamentale](#)
- [Sperimentazione](#)
- [Ufficio controlli](#)
- [Servizi e Progetti](#)
- [Appuntamenti ed iniziative](#)
- [Pubblicazioni e Notiziario](#)

Ultimi articoli

- 21.06.07**
[Bollettino di Lotta integrata](#)
- 21.06.07**
[Modelli previsionali](#)
- 21.06.07**
[Bollettino antiperonosporico](#)

Risorse

- SITI DI INTERESSE
AGRICOLO**



Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

Home Page » Indicazioni di Difesa » Difesa vite

Lotta Antiperonosporica alla VITE
Si consiglia il Trattamento N. **7**
entro 19 giugno
Modality of use of the product indicated on the label.
preventiva tradizionale

bollettino
antiperonosporico

impedire eventuali infezioni secondarie (si ricorda che è sufficiente una bagnatura per innescarle).

Si consiglia quindi di effettuare un trattamento **ENTRO MARTEDI' 19 GIUGNO** con formulati ad azione **"PREVENTIVA IN RAMEICI"** (Poltiglia bordolese, ossicloruro di rame, idrossido di rame, ecc.) (cliccare sulla tipologia di azione per accedere al servizio **"CONOSCERE IL FORMULATO"**; per maggiori informazioni vedi fondo pagina). Tale trattamento manterrà protetta la vegetazione per circa 7 giorni a seconda delle condizioni climatiche e della crescita della coltura.

E' ALTRESI' IMPORTANTE MANTENERE UNA COSTANTE PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE CON PRODOTTI ANTIOIDICI di pari persistenza (zolfo bagnabile) (cliccare sul prodotto antioidico consigliato per accedere al servizio **"CONOSCERE IL FORMULATO"**; per maggiori informazioni vedi fondo pagina).

Si ricorda inoltre che il trattamento obbligatorio contro lo **SCAFOIDEO DELLA VITE** andrà effettuato tra il **15 ed il 25 GIUGNO** (per maggiori informazioni clicca qui)

N.B. qualora si verificassero piogge abbondanti ed intense sulla vegetazione **NON PROTETTA** intervenire con prodotti endoterapici in miscela nel più breve tempo possibile dall'evento piovoso. Si ricorda che i **DITIOCARBAMMATI** (Mancozeb, Metiram, ecc.) ed i formulati che li contengono in miscela non potranno essere impiegati **DOPO IL 30 GIUGNO**.

Bollettino antiperonosporico

Perché il trattamento antiperonosporico da effettuare ENTRO il 19 GIUGNO?

Considerando la possibile comparsa in campo di macchie di peronospora a seguito delle abbondanti precipitazioni delle settimane precedenti, in questa fase è importante mantenere una costante copertura della vegetazione e del grappolo al fine di

22.06.2007

Consorzio

Ruoli contributivi

Indicazioni di Difesa

- **Lotta integrata (consigli per i trattamenti antiparassitari)**
- **Modelli di previsione delle malattie**
- **Difesa vite**
- **Difesa pomacee**
- **Flavescenza dorata e legno nero**
- **Cavallette**

Servizio SMS

Lotte obbligatorie

Verde ornamentale

Sperimentazione

Ufficio controlli

Servizi e Progetti

Appuntamenti ed iniziative

Pubblicazioni e Notiziario

Ultimi articoli

Preventiva con rameici

I prodotti a base di rame hanno la caratteristica di essere preventivi a buona persistenza. Sono indicati per i trattamenti post-allegazione in quanto hanno la capacità di agevolare la legnificazione e per l'azione collaterale contro lo sviluppo della botrite

[Ossicloruro di rame](#)

[Idrossido di rame](#)

[Solfato di Rame](#)

[Ossido di Rame](#)

[Miscele di Rameici](#)

Preventiva con rameici

I prodotti a base di rame hanno la caratteristica di essere preventivi a buona persistenza. Sono indicati per i trattamenti post-allegazione in quanto hanno la capacità di agevolare la legnificazione e per l'azione collaterale contro lo sviluppo della botrite

Ossicloruro di rame Idrossido di rame Solfato di Rame Ossido di Rame Miscele di Rameici

Prodotti

Nome prodotto	Distribuzione	Composizione	Indicazione di pericolo	Intervallo di sicurezza	Informazioni di Impiego	Altre informazioni
FORMULATO	PRODUTTORE	RAME - OSSICLORURO DI RAME (20% pari a 276 g/l)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitogest
FORMULATO	PRODUTTORE	RAME - OSSICLORURO DI RAME (25% pari a 377,5 g/l)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitogest
FORMULATO	PRODUTTORE	RAME - OSSICLORURO DI RAME (25% pari a 377,5 g/l)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitogest
FORMULATO	PRODUTTORE	RAME - OSSICLORURO DI RAME (32%)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitogest

Preventiva con rameici

I prodotti a base di rame hanno la caratteristica di essere preventivi a buona persistenza. Sono indicati per i trattamenti post-allegazione in quanto hanno la capacità di agevolare la legnificazione e per l'azione collaterale contro lo sviluppo della botrite

Ossicloruro di rame

Idrossido di rame

Solfato di Rame

Ossido di Rame

Miscele di Rameici

PRODOTTO

Anticrittogamico rameico.

Distribuito da: MAKHTESHIM-AGAN ITALIA


COMPOSIZIONE

RAME - OSSICLORURO DI RAME

(25% pari a 377,5 g/l)

Registrazione n.: 12856 del 18/11/2005

Utilizzo del prodotto



Fungicida di contatto a base di Rame ossicloruro 25% in formulazione flowable (sospensione concentrata), costituito da particelle micronizzate in grado di distribuirsi uniformemente sulla vegetazione trattata risultando pertanto adatto ad applicazioni a basso volume d'acqua. Impiegare alla dose di 200-400 ml/hl. Non è miscibile con gli agrofarmaci a reazione alcalina. Non impiegare durante la fioritura. E' disponibile in formulazione colorata e non.

[Scarica Pagina catalogo \(305 Kb\) 26/01/2007](#)



È un sito IMAGE LINE®

Banca Dati

Preparati commerciali

Sostanze attive

Ricerca per impiego
(preparati)

Ricerca per impiego
(sostanze attive)

Preparati revocati

Aziende del settore

I prodotti più visti

Partner Fitogest

BAYER CROSCIENCE
DOW AGROSCIENCES ITALIA
S.R.L.
SYNGENTA CROP PROTECTION
BASF ITALIA - DIVISIONE AGRO
SIAPA
ISAGRO ITALIA
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA
MAKHTESHIM-AGAN ITALIA
CHIMBERG
SARIAF GOWAN
CEREXAGRI
SIVAM
CHEMINOVA
CHEMIA
AGRIMPORT
MANICA
INTRACHEM BIO ITALIA
EUROPHYTO T.S.A.

Download pubblicazioni

Informazione

È disponibile il database aggiornato al 15 giugno 2007: contiene i dati di 4459 preparati di cui 2564 attualmente segnalati in commercio. Ultima registrazione inserita: n. 13794 del 12/04/2007. Sostanze attive attualmente censite: 392.

Fitogest.com - il motore di ricerca degli agrofarmaci

Cerca: in

[Nuova ricerca](#) | [Versione stampabile](#)

PRODOTTO

Anticrittogamico rameico.

Azione: Anticrittogamico

Formulazione: SOSPENSIONE CONCENTRATA

Indicazioni di pericolo:

Tossicologica: non classificato

Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)

Chimico-Fisica: --

Azienda detentrica della registrazione:

Numero della registrazione: 12856 del 18/11/2005

Distribuito in Italia da:

Attualmente segnalato in commercio: si

-
nessun
simbolo



COMPOSIZIONE

RAME - OSSICLORURO DI RAME

(25% pari a 377,5 g/l)

Impieghi autorizzati in Etichetta

Questo servizio ti offre la possibilità di conoscere tutte le **colture registrate** e gli **intervalli di sicurezza** consentiti per questo prodotto.

Scadenza servizio: il tuo abbonamento scade il 14/05/2010

Registrato su:	Intervallo di sicurezza
Aglio	20 giorni
Agrumi	20 giorni
Albicocco	20 giorni
Asparago	20 giorni
Barbabietola da zucchero	20 giorni

Comunicazioni

[Invia ad un amico](#)

Etichetta ministeriale



ETICHETTA MINISTERIALE in DPD

Scarica materiali informativi



Presentazione

**MAKHTESHIM-AGAN ITALIA -
Presentazione (26/01/2007) - 305 Kb**

* i materiali sono ordinati in funzione della data dell'ultimo documento inserito on-line

FitoGest 2007
La Banca Dati degli Agrofarmaci

**:: 550 Sostanze attive
:: 2.509 Etichette G.U.
:: 2.525 Preparati**

NUOVA VERSIONE

riservato ai rivenditori

**CD ROM
SDSr
2007**

liberati dal pensiero!
consegna le Schede di Sicurezza
e risparmia il 95%

**ordina subito
il CD ROM SDSr**



RAMENTO

BASSANO

CURATIVI

COPERTURA